

BENZOSEPT®

Bromure de benzododécinium 1,25 mg / 5 ml
Collyre, flacon 5 ml

FORME ET PRÉSENTATION :

Collyre en solution. Boîte de 1 flacon de 5 ml.

COMPOSITION :

Bromure de benzododécinium..... 25 mg
Excipients : chlorure de sodium, eau purifiée q.s.p. 100 ml

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Antiseptique à usage ophtalmique.

INDICATIONS :

Traitement antiseptique des affections de l'œil : conjonctivite, kératites et blépharites.

CONTRE-INDICATIONS :

Hypersensibilité aux antiseptiques locaux de la famille des ammoniums quaternaires.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas injecter, ne pas avaler.
- Le collyre ne doit pas être administré en injection péri- ou intraoculaire.
- En cas de traitement concomitant par un autre collyre, espacer de 15 minutes les instillations.
- En cas d'hypersensibilité, arrêter le traitement.
- En cas d'affections superficielles de l'œil, le port de lentilles est déconseillé.
- Le traitement est habituellement limité à 7 jours.
- En l'absence d'amélioration ou en cas d'aggravation des symptômes la conduite à tenir doit être réévaluée.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

L'efficacité d'un collyre peut être perturbée par l'instillation simultanée d'un autre collyre.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse : L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse. Il n'existe pas actuellement de données pertinentes, ou en nombre suffisant, pour évaluer un éventuel effet malformatif ou foetotoxique de ce de ce médicament lorsqu'il est administré pendant la grossesse.

Allaitement : L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement, en raison de l'absence de données du passage de ce médicament dans le lait maternel.

DANS TOUS LES CAS, DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :

Aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'a été observé.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Une irritation transitoire de l'œil peut survenir lors de l'utilisation de ce médicament.

SIGNALER OBLIGATOIREMENT A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE OU GENANT QUI N'EST PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

SURDOSAGE :

En cas de surdosage, rincer au sérum physiologique stérile.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Posologie :

En instillation oculaire :
Instillation d'une goutte de collyre, 2 à 3 fois par jour.

Mode d'administration :

- En instillation oculaire.
- Se laver soigneusement les mains.
- Eviter de toucher l'œil ou les paupières avec l'embout du flacon.
- Instiller la goutte de collyre dans le cul-de-sac conjonctival inférieur de l'œil (ou des yeux) malade(s) en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas.
- Reboucher le flacon après utilisation.

SE CONFORMER OBLIGATOIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE VOTRE MEDECIN.

PRECAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION.

- A conserver à une température inférieure à 25°C.
- Tout flacon entamé doit être utilisé dans les 15 jours.

Médicament autorisé N° : 9093121

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Ceci est un produit qui affecte la santé et le non-respect du mode d'administration vous met en danger.
- Suivez attentivement la prescription du médecin, le mode d'emploi et les conseils du pharmacien.
- Le médecin et le pharmacien sont les experts du médicament et savent ses bénéfices et ses risques.
- N'arrêtez pas la prise du traitement de votre propre initiative.
- Ne renouvelez pas l'approvisionnement en ce médicament sans revenir au médecin.
- Ne laissez pas les médicaments à la portée des enfants.

CONSEIL DES MINISTRES ARABES DE LA SANTE



Titulaire/Exploitant/Fabricant

UNIMED

Z.I. Kalâa Kébirâ - BP : 38

4060 TUNISIE

Tél. : (+216) 70 029 501

Fax : (+216) 73 342 472

Site Web : www.unimed.com.tn

Edition : 03

Date : 10 / 2023


14BEN101



Se laver soigneusement les mains.



Visser le bouchon à fond pour percer.



Dévisser le bouchon.



Retourner le flacon, appuyer légèrement au milieu et instiller dans le cul-de-sac conjonctival inférieur de l'œil en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas.

Titre :	Notice BENZOSEPT 5 ml
Version :	03
Date de réalisation :	09/10/2023
Dimension	130 x 170 mm
Destination :	TUNISIE

بنزوسبت®

بروميد البنزودوديسيونيوم 1،25 مغ / 5 مل
قطرات للعين، قارورة ذات 5 مل

الشكل :

قطرات للعين. علبية تحتوي على قارورة ذات 5 مل.

التركيبة :

بروميد البنزودوديسيونيوم.....25 مغ

سواغات : كلوريد الصوديوم، ماء منقى كاف لـ..... 100 مل

الصفء العلاجي :

معقم للعين.

دواعي الاستعمال:

علاج معقم موضعي لأمراض العين: التهاب الملتحمة، التهاب القرنية

والتهاب الجفن.

موانع الاستعمال:

فرط الحساسية للمطهرات الموضعية من عائلة الامونيوم الرباعية.

التحذيرات واحتياطات الاستعمال:

- لا يجوز حقن أو ابتلاع هذا الدواء.

- لا ينبغي حقن هذا الدواء حول العين أو داخلها.

- في حالة العلاج المتزامن مع قطرة عين أخرى، يجب المباشرة بين

عمليتي التقطير بـ 15 دقيقة.

- في حالة فرط الحساسية، توقف عن العلاج.

- في حالة وجود أمراض سطحية في العين، لا ينصح بارتداء العدسات.

- يقتصر العلاج عادة على 7 أيام.

- في حالة عدم التحسن أو في حالة تفاقم الاعراض، يجب إعادة تقييم

الاجراء الواجب اتخاذه.

التفاعلات الدوائية وتفاعلات أخرى :

قد تتغير فعالية قطرة عين واحدة إذا تم التقطير المتزامن لقطرة عين

أخرى.

الحمل والإرضاع :

الحمل :

لا ينصح باستخدام هذا الدواء خلال فترة الحمل. لا توجد حالياً أي بيانات

ذات صلة أو كافية لتقييم التأثير التثوي أو السام للجنين لهذا الدواء عند

تناوله أثناء الحمل.

الإرضاع :

يجب تجنب استخدام هذا الدواء أثناء الرضاعة الطبيعية، وذلك بسبب

عدم وجود بيانات حول مرور هذا الدواء إلى حليب الأم.

في جميع الحالات، استشييري طبيبك.

السياقة واستعمال الآلات :

لم تتم ملاحظة أي تأثير على القدرة على القيادة واستخدام الآلات.

تأثيرات غير مرغوب فيها :

- قد يحدث تهيج عابر للعين عند استخدام هذا الدواء.

قم بإبلاغ طبيبك أو الصيدلاني بأي تأثير غير مرغوب فيه أو مقلق لم

يتم ذكره في هذه النشرة.

تجاوز الجرعة :

في حالة الجرعة الزائدة، قم بالشطف مع المصل الفسيولوجي المعقم.

المقادير وطريقة الاستعمال :

المقادير :

قطر قطرة من قطرات العين 2 إلى 3 مرات يومياً.

طريقة الاستعمال :

للتقطير داخل العين.

- اغسل يديك جيداً.

- تجنب ملامسة العين أو الجفون بطرف القارورة.

- قطر قطرة واحدة في رديئة الملتحمة السفلى للعين (أو العين) المصابة

بالنظر إلى الأعلى وسحب الجفن السفلي قليلاً نحو الأسفل.

- اعلق القارورة بعد التقطير.

يجب الالتزام بدقة بتعليمات الطبيب.

الحفظ :

- يحفظ في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.

- يجب استعمال القارورة خلال 15 يوماً من تاريخ فتحها.

التأشيرة : 9093121

إن هذا دواء

- هذا مستحضر يؤثر على صحتك واستعماله خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفه لك.
- الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

صاحب التسجيل/المشغل/المصنع

يونيماد

المنطقة الصناعية القنعة الكبرى

صرب : 38 - 4060 تونس

الهاتف : 70 029 501 (+216)

الفاكس : 73 342 472 (+216)



موقع الواب : www.unimed.com.tn

نشرة : 03

تاريخ : 10 / 2023

14BEN101

إقلب القارورة واضغط على وسطها بلين، لتتزل القطرة في العين، قطر داخل رديئة الملتحمة السفلى للعين وذلك بالنظر إلى أعلى وجذب الجفن السفلي قليلاً إلى الأسفل.



Titre :	Notice BENZOSEPT 5 ml
Version :	03
Date de réalisation :	09/10/2023
Dimension	130 x 170 mm
Destination :	TUNISIE