

CYCLOCOL®

Chlorhydrate de cyclopentolate 2,5 mg/0,5 ml
Collyre, Ophtadose de 0,5 ml

FORME ET PRÉSENTATION :

Solution oculaire stérile, boîte de 1 ophtadose de 0,5 ml.

COMPOSITION :

Chlorhydrate de cyclopentolate..... 500 mg

Excipients : chlorure de sodium, phosphate monopotassique, phosphate dipotassique, acide chlorhydrique concentré, eau purifiée q.s.p.100 ml

PROPRIÉTÉS :

Mydriatiques et cycloplégiques, anticholinergiques.

INDICATIONS :

Chez l'adulte et l'enfant de 1 an et plus :

- Cycloplégie et mydriase avant les mesures de réfraction.
- Diagnostic des étiologies post-chirurgicales.
- Dilatation pré-opératoire pour cataracte, photocoagulation.

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des composants du collyre.
- Risque de glaucome par fermeture de l'angle.
- Enfant de moins d'un an.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas administrer en injection péri ou intraoculaire.
- En cas d'hypersensibilité, arrêter le traitement.
- Ne pas laisser à la portée des enfants : risque d'intoxication aigue par ingestion accidentelle.

- Utiliser avec précaution chez les patients, en particulier les enfants, ayant eu auparavant une réaction systémique sévère avec de l'atropine (locale et/ou systémique).

- Le risque de toxicité est plus élevé chez l'enfant et le sujet âgé.

- Afin d'éviter les effets systémiques induits par le passage du cyclopentolate dans la circulation générale par les voies lacrymales et par ingestion orale, il est recommandé, surtout chez l'enfant et le sujet âgé, de garder la paupière fermée et en même temps de comprimer l'angle interne de l'œil pendant 1 minute après chaque instillation et d'essuyer l'excédent sur la joue.

- Il est recommandé d'établir une surveillance étroite de l'enfant durant 30 minutes suivant l'instillation.

- Afin d'éviter les surdosages, il convient d'éviter les installations répétées et ne pas dépasser les posologies maximales recommandées dans un intervalle de temps donné (voir rubrique « Posologie »).

- Risque de crise de glaucome aigu par obstruction mécanique des voies d'élimination de l'humeur aqueuse chez les sujets présentant un angle iridocornéen étroit.

- Glaucome à angle ouvert : CYCLOCOL® peut être utilisé dans le glaucome chronique après avoir vérifié que l'angle est bien ouvert.

- Risque de trouble du système nerveux central, surtout chez les jeunes enfants : administrer avec précaution chez les patients présentant des symptômes d'une atteinte du système nerveux central.

- Risque d'hyperthermies : utiliser avec précaution chez les patients, en particulier les enfants, qui peuvent être exposés à des températures extérieures élevées ou qui sont fébriles.

- Utiliser avec précaution en cas d'adénome prostatique.

- Les patients peuvent ressentir une sensibilité à la lumière et doivent se protéger les yeux lorsque la lumière est vive.

Population pédiatrique

- Ce médicament ne doit pas pénétrer pas dans la bouche de votre enfant et ne coule pas sur ses joues. Lavez immédiatement vos mains ainsi que les mains et les joues de votre enfant après chaque administration.

- Des troubles digestifs peuvent survenir suite à l'utilisation ophtalmique de ce produit chez les nourrissons. Il est recommandé de ne rien leur donner à manger dans les 4 heures qui suivent l'examen.

- Les nourrissons, prématurés (il est à rappeler que CYCLOCOL® est contre indiqué chez les enfants âgés moins de 1 an), jeunes enfants ou enfant atteints de : syndrome de Down, paralysie spastique, lésions cérébrales sont particulièrement sensibles aux effets indésirables de ce médicament. Prenez conseil auprès votre médecin, car des effets indésirables graves peuvent survenir lors de l'utilisation de ce produit.

- Après administration, surveiller attentivement votre enfant pendant au moins 30 minutes.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

INFORMEZ VOTRE MEDECIN OU PHARMACIEN SI VOUS PRENEZ, AVEZ RECEMMENT PRIS OU POURRIEZ PRENDRE TOUT AUTRE MEDICAMENT.

- Autres médicaments atropiniques (antidépresseurs imipraminiques, la plupart des antihistaminiques H1 atropiniques, antiparkinsoniens anticholinergiques, antispasmodiques atropiniques, disopyramide, neuroleptiques phénothiaziniques ainsi que la clozapine) : addition des effets indésirables atropiniques à type de rétention urinaire, constipation, sécheresse de la bouche.

- En cas d'utilisation de plusieurs médicaments ophtalmiques, les administrations doivent être espacées d'au moins 15 minutes. Les pommades ophtalmiques doivent être administrées en dernier.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :

CYCLOCOL® a une influence importante sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. L'instillation de CYCLOCOL® entraîne une dilatation de la pupille (mydriase) gênante pendant quelques heures. En conséquence, après instillation, la conduite de véhicules et/ou l'utilisation de machines sont fortement déconseillées pendant toute la durée des troubles visuels.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets indésirables oculaires

- Risque de glaucome aigu par fermeture de l'angle.

- Gêne liée à l'augmentation de la taille de la pupille (mydriase), sensibilité excessive à la lumière (photophobie), difficultés pour ajuster sa vision se prolongeant dans le temps (troubles de l'accommodation prolongés).

- Irritation locale, picotement, vision floue, douleur oculaire, possibilité de réaction allergique.

Effets indésirables systémiques

Le cyclopentolate en collyre passe dans la circulation générale et peut entraîner des effets systémiques particulièrement chez l'enfant et le sujet âgé.

Les effets indésirables sont essentiellement neurologiques et psychiatriques :

- en particulier : agitation, hyperexcitabilité ou somnolence brutale, confusion, amnésie rétrograde, troubles de l'équilibre, maux de tête, vertiges,
- plus rarement à posologies thérapeutiques : convulsions et hallucinations.
- L'enfant et le sujet âgé ont des réponses variables aux collyres atropiniques.

D'autres signes d'imprégnation atropinique sont fréquents :

- Rougeur de la face, accélération du rythme cardiaque (tachycardie), sécheresse buccale.
- Rétention urinaire en particulier chez le sujet âgé avec adénome prostatique.
- Fièvre chez l'enfant, rarement sévère sauf en cas de surdosage
- Troubles digestifs : nausée, vomissements, constipation en particulier chez le sujet âgé, augmentation du volume de l'abdomen, obstruction intestinale et occlusion chez le nouveau-né prématuré (il est à rappeler que CYCLOCOL® est contre indiqué chez les enfants âgés moins de 1 an).

Les effets indésirables du cyclopentolate surviennent dans les 20 à 30 minutes qui suivent l'instillation, et bien que généralement transitoires (cessant en 4 à 6 heures), les symptômes peuvent durer 12 à 24 heures.

Les enfants sont plus exposés au développement d'effets indésirables généraux graves, certains sont décrits ci-dessus, particulièrement chez les prématurés et les nourrissons (il est à rappeler que CYCLOCOL® est contre indiqué chez les enfants âgés moins de 1 an), les jeunes enfants ou les enfants atteints du syndrome de Down, de paralysie spastique ou de lésions cérébrales.

SI VOUS RESSENTEZ UN QUELCONQUE EFFET INDESIRABLE, PARLEZ-EN A VOTRE MEDECIN, VOTRE PHARMACIEN OU A VOTRE INFIRMIER/ERE. CECI S'APPLIQUE AUSSI A TOUT EFFET INDESIRABLE QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE

SURDOSAGE :

En cas de surdosage avec CYCLOCOL®, rincer l'œil (les yeux) à l'eau tiède.

Ne mettez pas d'autres gouttes jusqu'à ce que le moment soit venu de mettre la goutte suivante.

Deux situations sont possibles :

- soit par surdosage lors de l'administration du collyre (notamment lors d'instillations répétées) ;
- soit du fait d'une ingestion accidentelle d'un flacon de collyre multidose, notamment par l'enfant.

Les signes « rougeur de la face, sécheresse de la bouche et mydriase » aident au diagnostic. La gravité est liée aux troubles de régulation thermique, à la toxicité neurologique et psychiatrique : convulsions, délire voire coma.

En cas de surdosage sévère ou d'ingestion accidentelle, contactez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien car des réactions sévères peuvent survenir, en particulier chez les enfants.

La prise en charge est symptomatique en milieu spécialisé.

Si vous oubliez d'utiliser CYCLOCOL® : N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié d'utiliser.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Posologie :

Voie ophtalmique.

➤ **Adulte** : une goutte, suivie d'une deuxième goutte instillée 10 minutes après si nécessaire.

➤ Population pédiatrique

IL EST RECOMMANDE D'ETABLIR UNE SURVEILLANCE ETROITE DES JEUNES ENFANTS ET ENFANTS DURANT LES 30 MINUTES SUIVANT L'INSTILLATION.

- Jeunes enfants (1 an à 3 ans) : une instillation dans l'œil.
- Enfants (3 ans à 12 ans) : une instillation dans l'œil. En cas de mydriase insuffisante, et uniquement dans ce cas, une 2^{ème} instillation pourra être administrée dans les 10 à 30 minutes suivant la 1^{ère} instillation.

Mode d'administration :


- Se laver soigneusement les mains.
- Eviter de toucher l'œil ou les paupières avec l'embout de l'ophtadose.
- Instiller la goutte de collyre dans le cul de sac conjonctival inférieur de l'œil en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas.
- Afin d'éviter les effets systémiques induits par le passage du cyclopentolate dans la circulation générale par les voies lacrymales et par ingestion orale, il est recommandé, surtout chez l'enfant et le sujet âgé, de garder la paupière fermée et en même temps de comprimer l'angle interne de l'œil avec votre doigt pendant 1 minute après chaque instillation et d'essuyer l'excédent sur la joue. Cela aide à stopper la propagation du médicament dans le reste du corps.
- Pour éviter l'ingestion, surtout chez l'enfant (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI).
- Jeter l'unidose après utilisation. Ne pas réutiliser une unidose ouverte pour une administration ultérieure.
- En cas de traitement concomitant par un autre collyre, il convient d'attendre 15 minutes entre chaque instillation.
- Une occlusion nasolacrymale ou une fermeture douce des paupières après administration est recommandée.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :

- **Avant ouverture** : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
- **Après ouverture** : Jeter l'ophtadose immédiatement après utilisation.

TABLEAU A

Médicament autorisé N° : 9093491



Ouvrir le récipient en tordant vigoureusement son extrémité supérieure.



Instiller la goutte dans le sac conjonctival de l'œil atteint

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Ceci est un produit qui affecte la santé et le non-respect du mode d'administration vous met en danger.
- Suivez attentivement la prescription du médecin, le mode d'emploi et les conseils du pharmacien.
- Le médecin et le pharmacien sont les experts du médicament et savent ses bénéfices et ses risques.
- N'arrêtez pas la prise du traitement de votre propre initiative.
- Ne renouvelez pas l'approvisionnement en ce médicament sans revenir au médecin.
- Ne laissez pas les médicaments à la portée des enfants.

CONSEIL DES MINISTRES ARABES DE LA SANTE



Titulaire/Exploitant/Fabricant
UNIMED
Z.I. Kalâa Kébira - BP : 38 - 4060 TUNISIE
Tél. : (+ 216) 70 029 501 - Fax : (+216) 73 342 472
Site Web: www.unimed.com.tn

Edition : 05
Date : 01 / 2025

14CYC101

Titre :	Notice CYCLOCOL® 0,5ml (Ophtadose)
Version :	05
Date de réalisation :	08/01/2025
Dimension	150 x 270 mm
Destination :	TUNISIE

سيكلوكول®

هيدروكلوريد السكلونيتولات 2,5 مغ / 0,5 مل
قطرات للعين، وحدة قياسية ذات 0.5 مل

الشكل :

قطرات معقمة للعين. علبه تحتوي على وحدة قياسية ذات 0.5 مل.

التركيبية :

هيدروكلوريد السكلونيتولات..... 500مغ

سواغات : كلوريد الصوديوم، فسفات أحادي البوتاسيوم، فسفات ثنائي البوتاسيوم، حمض الهيدروكلوريك المركز ، ماء منقى كاف لـ.....100 مل

الصفى العلاجي :

موسّع للحذقة، مشلول العضلة الهيئية، مضاد الفعل الكوليني.

دواعى الإستعمال :

لدى البالغين و الأطفال الذين سنهم سنة أو أكثر :

- شلل العضلة الهيئية، توسع الحذقة قبل قياس الانكسار العيني.
- تشخيص الحول ما بعد الجراحة.
- توسع ما قبل جراحة الساد، التخثر الضوئي.

موانع الإستعمال :

- فرط الحساسية لأي من مكونات قطرة العين.
- خطر الجلوكوما مغلق الزاوية.
- الطفل دون سن سنة واحدة.

التحذيرات و احتياطات الإستعمال :

- لا تستعمل عن طريق الحقن حول أو داخل العين.
- إيقاف العلاج في حالة فرط الحساسية.
- لا تترك في متناول الأطفال : خطر التسمم الحاد عن طريق الابتلاع العرضي.
- يجب توخي الحذر عند المرضى، خاصة الأطفال، الذين كانوا يعانون في السابق من رد فعل حاد مع الأتروبين (محلي و / أو شامل).
- خطر السمية أعلى عند الأطفال وكبار السن.
- من أجل تجنب التأثيرات الجهازية الناجمة عن مرور السكلونيتولات إلى الدورة الدموية العامة عبر القناة السمعية وعن طريق الابتلاع عن طريق الفم، يوصى، خاصة عند الأطفال وكبار السن، بإبقاء الجفن مغلقا وفي نفس الوقت الضغط على الجفن. الزاوية الداخلية للعين لمدة دقيقة واحدة بعد كل تطهير وامسح الفائض على الخد.
- يوصى بمراقبة الطفل عن كثب لمدة 30 دقيقة بعد التطهير.
- تجنب الجرعات الزائدة، يجب تجنب التطهير المتكرر وعدم تجاوز الجرعات القصوى الموصى بها خلال فترة زمنية معينة (انظر فقرة « المقادير »).
- احتمال خطر نوبة زرق حادة عن طريق انسداد ميكانيكي لمسالك آلة الخط المائي عند المرضى الذين يعانون من زاوية قزحي-قرنية ضيقة.
- زرق مفتوح الزاوية : يمكن استعمال سيكلوكول® في الجلوكوما المزمنة بعد التأكد من أن الزاوية مفتوحة.
- احتمال خطر اضطراب الجهاز العصبي المركزي، خاصة عند الأطفال الصغار: يستعمل بحذر عند المرضى الذين يعانون من اعراض تورط الجهاز العصبي المركزي.
- احتمال خطر ارتفاع الحرارة : يستعمل بحذر عند المرضى، وخاصة الأطفال، الذين قد يتعرضون لارتفاع درجات الحرارة المحيطة أو المحمومين.
- استعمال بحذر في حالة ورم بروتستاتي.
- قد يعاني المرضى من حساسية للضوء ويجب عليهم حماية أعينهم في الضوء الساطع.

الأطفال

- لا ينبغي أن يدخل هذا الدواء إلى فم طفلك أو يسيل على خديه. اغسل يديك وبدي طفلك وخدوده مباشرة بعد كل جرعة.
- قد تحدث اضطرابات في الجهاز الهضمي بعد تطهير هذا المنتج في العين عند الرضع. من المستحسن عدم إطلاعهم في غضون 4 ساعات من المعالجة.
- الرضع، الأطفال الخدج (يجب أن نذكر أن سيكلوكول® يمنع استعماله لدى الأطفال دون سن السنة)، الأطفال الصغار أو الأطفال الذين يعانون من: متلازمة داون، الشلل التشنجي، آفات الدماغ حساسة بشكل خاص للأثار الجانبية لهذا الدواء. استشر طبيبك للحصول على المشورة، حيث قد تحدث آثار جانبية خطيرة عند استعمال هذا المنتج.
- بعد تناول الدواء، راقب طفلك بعناية لمدة 30 دقيقة على الأقل.

التفاعلات الدوائية و التفاعلات الأخرى :

أخير طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرا أو قد تتناول أي دواء آخر.

- غيرها من الأدوية الأتروپينية (مضادات الاكتئاب إيميبرامين، معظم مضادات الهيسترين 1- H1) الأتروپينية، مضادات الكولين المضادة للبريكينسون، مضادات التشنج الأتروپينية، ديسوبيراميد، مضادات الدهان الفينوثيازين و الكلوزابين) : إضافة الآثار الجانبية للأتروپين مثل احتباس البول، والإمساك، خفاف الفم.
- عند استخدام العديد من قطرات العين، ينبغي تباعد الإستعمالات على مدار 15 دقيقة على الأقل.

يجب أن تستعمل مراهم العين في آخر الأمر.

الحمل و الإرضاع :

إذا كنت حاملا أو مرضعة، إذا كنت تعتدين أنك قد تكونين حاملا أو تخططين لإنتاج طفل، إستشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول هذا الدواء.

القيادة و استعمال الآلات :

سيكلوكول® له تأثير كبير على القدرة على القيادة واستعمال الآلات. بسبب تطهير سيكلوكول® تمدا من عجا لحذقة العين لينع ساعات، ونتيجة لذلك، لا ينصح بقيادة الشاحنات و / أو استعمال الآلات خلال كامل فترة الاضطرابات البصرية بعد الاستعمال.

تأثيرات غير مرغوب فيها :

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارا غير مرغوب فيها، لكنها لا تحدث عند الجميع.

آثار غير مرغوب فيها تأثر على العين :

- خطر الجلوكوما مغلق الزاوية.
- انزعاج بسبب تمدد حذقة العين، الحساسية المفرطة للضوء (الضياء)، صعوبات لضبط الرؤية الممتدة زمنيا (اضطرابات تأقلم العين المطول).
- التهيج الموضعي، الوخز، عدم وضوح الرؤية، ألم العين، الحساسية المحتملة.
- **الآثار الغير مرغوب فيها الشاملة :**
- تعبر قطرات العين سكلونيتولات إلى الدورة الدموية النظامية وقد تسبب تأثيرات شاملة خاصة عند الأطفال وكبار السن.
- الآثار الغير المرغوب فيها هي أساسا عصبية و نفسية :
- لا سيما الهياج، فرط الاستثارة أو النعاس المفاجئ، و الارتباك، وفقدان الذاكرة الرجوعي، اضطرابات التوازن، الصداع، الدوخة،
- آثار نادرة مع الجرعات العلاجية : تشنجات وهلوسة.
- لدى الطفل وكبار السن استجابات متغيرة لقطرات العين الأتروپينية.
- علامات أخرى شائعة تدل على التثرب الأتروپين :
- احمرار في الوجه، زيادة معدل ضربات القلب (عدم انتظام دقات القلب)، و جفاف الفم.
- احتباس البول خاصة عند كبار السن المصابين بورم بروتستاتي.
- حمى لدى الأطفال نادرا ما تكون شديدة باستثناء حالة الجرعة الزائدة.
- اضطرابات هضمية : غثيان وقيء وإمساك، وخاصة عند كبار السن، زيادة في حجم البطن،
- انسداد معوي وإطباق عند الأطفال حديثي الولادة المبكرة (يجب أن نذكر أن سيكلوكول® يمنع استعماله لدى الأطفال دون سن السنة).

الآثار السلبية لسكلونيتولات تحدث في غضون 20 إلى 30 دقيقة بعد الإستعمال، و رغم انها تكون عابرة عموما (تنتهي في 4-6 ساعات)، الا ان الأعراض يمكن أن تستمر لمدة 12 إلى 24 ساعة. الأطفال هم الأكثر تعرضا لظهور آثار سلبية شاملة خطيرة، وصف بعضها أعلاه، خاصة عند الرضع و الأطفال الخدج (يجب أن نذكر أن سيكلوكول® يمنع استعماله لدى الأطفال دون سن السنة) و الأطفال الصغار أو الأطفال الذين يعانون من متلازمة داون و الشلل التشنجي أو تلف في الدماغ. **إذا واجهت أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني أو الممرضة. ينطبق هذا أيضا على أي آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة.**

تجاوز الجرعة :

في حالة تجاوز الجرعة، اشطف العين (العينين) بماء دافئ.

هناك حالتان ممكنتان :

- إما بجرعة زائدة أثناء إعطاء قطرات العين (خاصة عند التطهير المتكرر) ؛
- أو عن طريق ابتلاع عرضي لفقرورة من قطرات العين متعددة الجرعات، خاصة من قبل الطفل. تساعد علامات "احمرار الوجه، وجفاف الفم و اتساع الحذقة" على التشخيص. إن الخطورة متعلقة باضطرابات التنظيم الحراري، تسمم عصبي و نفسي : تشنجات وهذيان أو حتى غيبوبة.
- في حالة تناول جرعة زائدة شديدة أو ابتلاع عرضي، اتصل بالطبيب أو الصيدلاني على الفور عند حدوث ردود فعل شديدة، خاصة عند الأطفال.
- يتم التعامل مع الأعراض في محيط مختص.

إذا نسيبت استعمال سيكلوكول®، فلا تستعمل جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة الفردية التي نسيبت استعمالها.

المقادير و طريقة الاستعمال :

المقادير :

للتطهير داخل العين.

◀ **البالغين :** قطرة واحدة، تليها قطرة ثانية بعد 10 دقائق إذا استلزم الأمر.

◀ **الأطفال :**

من المستحسن إجراء مراقبة دقيقة للأطفال الصغار و الأطفال خلال 30 دقيقة بعد التطهير.

- الأطفال الصغار (من 1 إلى 3 سنوات) : قطرة واحدة في العين.
- الأطفال (3 سنوات إلى 12 سنة) : قطرة واحدة في العين. في حالة توسع غير كافي للحذقة و في هذه الحالة فقط، يمكن التطهير ثانية خلال 10 إلى 30 دقيقة بعد التطهير الأول.

طريقة الإستعمال :


- اغسل يديك جيدا.
- تجنب تماس طرف الوحدة مع العين أو الجفون.
- قطر في كيس المتلمحة السفلي للعين، مع النظر إلى الأعلى و سحب الجفن السفلي إلى الأسفل قليلا.
- لتجنب التأثيرات الجهازية الناجمة عن مرور السكلونيتولات إلى الدورة الدموية العامة عن طريق القناة السمعية و عن طريق تناوله عن طريق الفم، يوصى، خاصة عند الأطفال وكبار السن، بإبقاء الجفن مغلقا وفي نفس الوقت الضغط على الجفن. الزاوية الداخلية للعين بإصبعك لمدة دقيقة واحدة بعد كل تطهير وامسح الزائد من الخد. وهذا يساعد على وقف انتشار الدواء في بقية أنحاء الجسم.
- لتجنب الابتلاع، وخاصة عند الأطفال (انظر التحذيرات و إحتياطات الإستعمال).
- تخلص من الجرعة الواحدة بعد الإستعمال. لا تعيد استعمال جرعة واحدة مفتوحة للإعطاء لاحقا.
- إذا كان العلاج مزمنا مع علاج بقطرة أخرى، انتظر 15 دقيقة بعد كل عملية تطهير.
- ينصح ببد العمر الانفي الدمعي أو الضغط اللين للجفون بعد إستعمال الدواء.
- **الحفظ :**
- **قيل الفتح :** يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.
- **بعد الفتح :** يجب إلقاء الوحدة قياسية مباشرة بعد استعمالها.

جدول أ

التنشيرة : 9093491



قطر داخل كيس المتلمحة للعين المصابة



افتح الوحدة بلوي طرفها العلوي

Titre :	Notice CYCLOCOL® 0,5ml (Ophtadose)
Version :	05
Date de réalisation :	08/01/2025
Dimension	150 x 270 mm
Destination :	TUNISIE

نشرة : 05
تاريخ : 2025 / 01

14CYC101

صاحب التسجيل/المشغل/المصنّع

يونيماد

المنطقة الصناعية القطعة الكبرى ص.ب : 38 - 4060 تونس
الهاتف : (+216) 70 029 501 - **الفاكس :** (+216) 73 342 472
موقع الواب : www.unimed.com.tn



