

# ALPHACOL FREE®

Tartrate de brimonidine 10 mg/5ml

## Collyre

### FORME ET PRÉSENTATION

Collyre en solution stérile à 0,2% : Flacon multidose de 5 ml sans conservateur.

### COMPOSITION

Tartrate de brimonidine..... 200 mg  
Excipients : alcool polyvinyle, citrate de sodium, acide citrique monohydraté, chlorure de sodium, acide chlorhydrique et/ou hydroxyde de sodium, eau purifiée q.s.p..... 100 ml

### CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Sympathomimétique, antiglaucomateux.

### INDICATIONS

Réduction de la pression intraoculaire (PIO) élevée chez les patients ayant un glaucome à angle ouvert ou une hypertension oculaire :

- En monothérapie chez les patients présentant une contre-indication aux bêtabloquants à usage local.
- En association à d'autres traitements diminuant la pression intraoculaire dans le cas où une monothérapie ne permet pas d'atteindre la PIO cible.

### CONTRE-INDICATIONS

- Hypersensibilité à la brimonidine tartrate ou à l'un des excipients.
- Nouveau-né.

- Patients recevant un traitement inhibiteur de la mono-amine oxydase (MAO) ou des antidépresseurs affectant la transmission noradrénérique (antidépresseurs tricycliques et miansétrine).

### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Une attention particulière est nécessaire chez les patients atteints d'une maladie cardiovasculaire sévère ou instable et incontrôlée et chez les patients présentant des troubles hépatiques ou rénaux.

- ALPHACOL FREE® doit être utilisé avec précaution chez les patients souffrant de dépression, d'insuffisance cérébrale ou coronarienne, de phénomène de Raynaud, d'hypotension orthostatique ou de thromboangiite oblitérante.

- En cas de réaction allergique, le traitement doit être arrêté.

- Ne pas injecter, ne pas avaler.

- Chez l'enfant, la sécurité d'emploi de ce médicament n'a pas été établie. L'emploi de ce médicament n'est donc pas recommandé.

- Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple si vous avez oublié de prendre. Consultez votre médecin.

- N'interrompez pas votre traitement sans l'avis de votre médecin car votre PIO peut augmenter et entraîner une détérioration de votre vision.

### EN CAS DE DOUTE, DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

- Dépresseurs du système nerveux central (alcool, barbituriques, opiacés, sédatifs ou anesthésiques) : possibilité d'un effet additif ou potentielisateur.

- Médicaments affectant le métabolisme et la fixation des amines circulantes (chlorpromazine, méthylphénidate, réserpine) en conséquence, il convient de faire preuve de vigilance.

- Antihypertenseurs et/ou glucosides cardiotoniques : risque d'hypotension artérielle majoré.

- Agonistes ou antagonistes des récepteurs adrénergiques (isoprémaline, prazosine).

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

- ALPHACOL FREE® ne doit être utilisé que lorsque les bénéfices potentiels pour la mère dépassent les risques potentiels encourus par le fœtus.

- ALPHACOL FREE® ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

### EN CAS DE GROSSESSE OU D'ALLAITEMENT,

### DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE

### VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN


### MÉDICAMENT.

### CONDUITE ET UTILISATION DES MACHINES

ALPHACOL FREE® est susceptible de causer une vision trouble



Se laver soigneusement les mains



Lors de la première utilisation, enlever le bouchon puis pomper plusieurs fois jusqu'à la sortie de la première goutte (flacon tête en bas)



Instiller par pression sur la pompe à valve doseuse dans le cul de sac conjonctival inférieur de l'œil en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas

### CECI EST UN MÉDICAMENT

Le médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.

Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin, le mode d'emploi et les instructions du pharmacien.

- Le médecin et le pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.

- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.

- N'en reprenez pas les doses sans consulter votre médecin.

- Ne pas laisser les médicaments à la portée des enfants.

### CONSEIL DES MINISTRES ARABES DE LA SANTE



### LABORATOIRES UNIMED

Z.I. Kalâa Kébira - BP : 38 - 4060 TUNISIE

Tél. : (+ 216) 73 342 669 - Fax : (+216) 73 342 472

Site Web : [www.unimed.com.tn](http://www.unimed.com.tn)

Edition : 01

Date : 05 / 2015

14APC501

# الفاكول فري®

طرطرات بريمويندين 10 مل / 5 مل

قطرات للعين

المخاطر المحتملة على الجنين.

- لا يجب استعمال الفاكول فري® خلال فترة الإرهاص.

يجب إستئثارة الطبيب أو الصيدلاني في حالتي الحمل أو الإرهاص

قبل استعمال أي دواء.

السيادة و استعمال الآلات :

- يمكن لهذا الدواء أن يسبب اضطراب بصري أو غير عادي، بغض الارهاق و/أو النعاس مما يؤدي إلى عدم القدرة على القيادة أو استعمال الآلات، خاصة في الليل أو عند انخفاض الإضاءة.

تأثيرات غير مرغوب فيها :

- أثار بصريّة : تهيج بصري يشمل ردود فعل أرجية (احتقان، حرق، نفخ، حكة، احساس بجسم دخيل و جرثومات في الماتحة)، اضطرابات بصريّة، ونمة الجفون، التهاب الجفون، افرازات في الماتحة، الم و رطوبة عينية، رهاب الضوء، تاكل القرنية، جفاف عيني، بياض الماتحة، رؤية غير عاديّة و التهاب الماتحة.

- أثار عامّة : مسداع، نعسان، دوار، جفاف الفم، مذاق غير طبيعي، تعب، اعراض معينة معمّدة.

يجب اعلام الطبيب أو مزاعمة غير مذكورة في هذه التشرة. مرغوب فيها و مزاعمة غير مذكورة في حالة ظهور تأثيرات أخرى غير تجاوز العresa :

- تعاطي جرعة مفرطة عن طريق السبيل البصري هو إمكانية قليلة الاختلال.

- علامات تعاطي جرعة مفرطة عن طريق الفم من مناهضات الألقا-2 هي: انخفاض ضغط الدم، و هن، قيء، تهنة، انقطاع النفس، نقص الضغط، تضيق الحدقة.

المقادير و طريقة الاستعمال :

• لدى الكهول : قطرة واحدة من الفاكول فري® في العين أو العينين المصاتين مرتان في اليوم. يجب انتظار قرابة 12 ساعة بين القطرتين.

• لدى كبار السن : لا يتطلب استعمال هذا الدواء ملائمة الجرارات.

طريقة الاستعمال :

- التقطير داخل العين و ذلك بالضغط على مضخة الصمام القياسي.

- غسل اليدين جيدا.

- قفر و ذلك بالضغط على مضخة الصمام القياسي داخل رقبة الماتحة السفلية للعين و ذلك بالنظر إلى أعلى و جذب الجفن السفلي قليلا إلى الأسفل.

- مثيل كل قطرات العين، لتقليل احتمال الامتصاص الجهازي، ينصح بالضغط على كيس النعس على مستوى الانسداد لمدة دقيقة واحدة. يجب اتباع هذه الطريقة مباشرة بعد كل نفخة.

- عند استعماله لعدة طفرات للعين، انتظر من 5 إلى 15 دقيقة بين كل عملية نفخة.

يجب الالتزام بدقة بتعليمات الطبيب المباشر.

طريقة التحضير :

- يجب تقاديم تمساح طرف القطرة مع العين أو الجفون.

- يجب إحكام غلق القارورة و إرجاعها داخل العلبة بعد كل استعمال.

- في حالة تجاوز المطرادات المحددة من الفاكول فري®، يجب غسل العينين بمحلول ملحي فيزيولوجي معقم.

الحفظ :

- يجب استعمال القارورة خلال 8 أسابيع من تاريخ قتها.


- يحفظ في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية و بعده عن الصورة.

جدول : 1

التشيرة : 909 381 3 : 9



قطر و ذلك بالضغط على مضخة الصمام القياسي داخل رقبة الماتحة السفلية للعين و ذلك بالنظر إلى أعلى و جذب الجفن السفلي قليلا إلى الأسفل



خلال الاستعمال الأول ابرز العطاء ثم اثقب القارورة نحو الأسطل و اضغط عدد المرات حتى تزول قطرة الأولى



اغسل يديك جيدا

## إن هذا دواء

مستحضر يوثر على صحتك واستهلاكه لاحقاً للتعليمات يعرضك للخطر. أتبع بذلة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

- الطبيب و الصيدلاني هما المخبران يذالون و ينفعون و ضرورة.

- لا تقطع هذه الملاج المحددة لك من تفاصيل نفسك.

- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.

- لا ترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

نشرة : 01  
2015 / 05 / تاريخ :

14APC501

مخابر يونيميد

المنطقة الصناعية القلعة الكبri ص.ب: 38 - 4060 تونس  
الهاتف: +216 73 342 669 - الماكس: +216 73 342 472  
موقع الويب: www.unimed.com.tn

