KETOMED® 100

Kétoprofène 100 mg / 2 ml
Solution injectable I.M.

FORMES ET PRÉSENTATIONS :

Solution injectable intramusculaire stricte, ampoules de 2 ml.
Boîte de 2 ampoules et de 5 ampoules.

COMPOSITION :

Kétoprofène .... 5 g
Excipients : alcool benzylique, arginine, acide citrique monohydraté, eau P.P.I. q.s.p.. 100 ml
Excipient à effet notoire : alcool benzylique.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE :

Antirhumatismal, anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS).

INDICATIONS :

Elles procèdent de l'activité antalgique et anti-inflammatoire du kétoprofène, de l'importance des manifestations d'intolérance auxquelles le médicament donne lieu et de sa place dans l'éventail des produits anti-inflammatoires actuellement disponibles.

Elles sont limitées, chez l'adulte (plus de 15 ans), au :

- Traitement symptomatique de courte durée des :
  - rhumatismes inflammatoires en poussée,
  - lombalgies aiguës,
  - radiculalgies.
- Traitement des algies d'origine néoplasique.
- Traitement des crises de coliques néphrétiques.

CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament est contre-indiqué dans les situations suivantes :

- Au-delà de 24 semaines d'aménorrhée (5 mois de grossesse révolus) (voir grossesse et allaitement),
- Hypersensibilité au kétoprofène ou à l'un des excipients du produit,
- Antécédents de réactions d'hypersensibilité telles que bronchospasme, asthme, rhinite, urticaire ou autres réactions allergiques au kétoprofène, à l'acide acétylsalicylique ou autres AINS. Des réactions anaphylactiques sévères, rarement fatales, ont été rapportées chez ces patients (voir effets indésirables) ; d'hémorragie ou de perforation digestive au cours d'un précédent traitement par AINS,
- Hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébro-vasculaire ou autre hémorragie en évolution,
- Ulcère peptique évolutif, antécédents d'ulcère peptique ou d'hémorragie récurrente (2 épisodes distincts ou plus d'hémorragie ou d'ulcération objectivés),
- Insuffisance hépatique sévère,
- Insuffisance rénale sévère,
- Insuffisance cardiaque sévère,
- Troubles de l'hémostase ou traitement anticoagulant en cours (contre-indication liée à la voie intramusculaire).
- En raison de la présence d'alcool benzylique, ce médicament est contre-indiqué chez les prématurés et les nouveau-nés à terme.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser KETOMED® 100 si vous êtes dans l'une des situations suivantes :

- Vous avez déjà eu de l'asthme associé à des polypes dans le nez ou à une inflammation au niveau du nez ou des sinus (rhinite ou sinusite chronique). La prise de ce médicament peut entraîner une gêne respiratoire ou une crise d'asthme, notamment chez les personnes allergiques à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien (voir rubrique contre-indication),
- Vous souffrez d'une maladie du cœur (hypertension et/ou insuffisance cardiaque), du foie ou du rein, ou de rétention d'eau ; de troubles de la coagulation ; d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin (telle que maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique),
- Vous avez déjà eu des problèmes digestifs (comme un ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien),
- Vous suivez déjà un traitement avec un médicament qui augmente le risque d'ulcère gastroduodénal ou,
- Vous avez déjà eu une réaction exagérée de la peau au soleil ou aux UV (cabine de bronzage).
- Personnes ayant un risque cardiovasculaire
- Vous avez des problèmes cardiaques.
- Vous avez déjà eu une attaque cérébrale (accident vasculaire cérébral).
- Ou vous pensez avoir des facteurs de risques de maladies cardio-vasculaires (par exemple vous avez une tension artérielle élevée, du diabète, un taux de cholestérol élevé ou si vous fumez).

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement.

Arrêtez le traitement et consultez immédiatement un médecin ou les urgences médicales :

- Si une crise d'asthme ou une difficulté à respirer survient après avoir reçu ce médicament. Ceci peut être le signe d'une allergie à ce médicament.
- Si vous avez une éruption de boutons ou des plaques sur la peau, des démangeaisons, un brusque gonflement du visage et du cou. Il peut alors s'agir d'une allergie à ce médicament.
- Si vous rejetez du sang par la bouche, si vous avez du sang dans les selles ou si vos selles sont colorées en noir. Il peut alors s'agir de saignements localisés dans votre estomac et/ou votre intestin (hémorragie digestive).
- Si vous souffrez d'ulcération gastro-intestinale.
- Arrêtez le traitement et prévenez votre médecin si des troubles de la vision surviennent (vision floue).
- Prévenez votre médecin si vous pensez avoir une infection (notamment en cas de fièvre), ou si vos symptômes s'aggravent. Comme tout anti-inflammatoire non stéroïdien, le kétoprofène peut masquer les symptômes d'une infection.

Si vous êtes âgé ou si votre poids corporel est faible vous avez plus de risque d'avoir des effets indésirables, en particulier des hémorragies gastro-intestinales, des ulcères et des perforations.

Votre médecin vous demandera de faire une prise de sang pour surveiller le fonctionnement de vos reins, de votre foie, et de votre cœur, et réduira la dose.

- Ce médicament contient 50 mg/2 ml d'alcool benzylique. Il peut provoquer des réactions toxiques et des réactions allergiques chez les nourrissons et les enfants jusqu'à 3 ans.

EN CAS DE DOUTE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

Vous devez toujours prévenir votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez ou recevez l'un des médicaments suivants avant de recevoir KETOMED® 100 :

des médicaments de la même famille que KETOMED® 100 (aspirine, anti-inflammatoires non stéroïdiens) qui sont utilisés pour diminuer l'inflammation et la fièvre et/ou pour calmer la douleur ; des corticostéroïdes ; des médicaments qui empêchent la formation de caillots et fluidifient le sang (anticoagulant par voie orale comme la warfarine, les inhibiteurs de la thrombine comme le dabigatran, les inhibiteurs direct du facteur Xa comme l'apixaban, le rivaroxaban et l'édoxaban, les antiagrégants plaquettaires, l'héparine injectable). Si la prise ou l'utilisation concomitante de l'un de ces médicaments s'avérait nécessaire, votre médecin devra vous surveiller étroitement en raison d'un risque accru de saignements ; du lithium (utilisé pour certains troubles de l'humeur) ; certains anti-cancéreux (pemetrexed, méthotrexate) ; des médicaments utilisés pour diminuer la tension et traiter certaines maladies du cœur (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, diurétiques, bêta-bloquants, antagonistes de l'angiotensine II, nicorandil et glycosides cardiaques) ; certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine) ; du deferasirox (utilisé pour abaisser la quantité de fer dans le sang) ; certains médicaments immunosuppresseurs utilisés en cas de greffe d'organe (ciclosporine, tacrolimus).

VOUS DEVEZ INFORMER VOTRE MEDECIN SI VOUS PRENEZ D'AUTRES MEDICAMENTS.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse :

La prescription d'AINS ne doit être envisagée que si nécessaire pendant les 5 premiers mois de grossesse. Votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament.

Entre 2 mois et demi et la fin du 5ème mois de grossesse (précisément entre 12 et 24 semaines d'aménorrhée), ce médicament ne sera utilisé que sur les conseils de votre médecin et en prise brève. L'utilisation prolongée de ce médicament est fortement déconseillée.

Au-delà du 5ème mois, toute prise même ponctuelle est contre-indiquée.

Allaitement :

Les AINS passent dans le lait maternel, par mesure de précaution, il convient d'éviter de les administrer chez la femme qui allaite.

DANS TOUS LES CAS, DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :

Prévenir les patients de l'apparition possible de vertiges, de somnolence, de convulsions ou troubles visuels; il est conseillé de ne pas conduire ou d'utiliser des machines, si l'un de ces symptômes apparaît.

EFFETS INDESIRABLES :

Les médicaments tels que KETOMED® 100, pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de traitement prolongée.

En général, la fréquence des effets indésirables est classée comme suit :

Très fréquent (plus de 1 personne sur 10) ; Fréquent (plus de 1 personne sur 100 et moins de 1 personne sur 10); Peu fréquent (plus de 1 personne sur 1000 et moins de 1 personne sur 100) ; Rare (plus de 1 personne sur 10000 et moins de 1 personne sur 1000) ; Très Rare (moins de 1 personne sur 10 000) ;

Arrêtez immédiatement le traitement et avertissez votre médecin, si les réactions suivantes surviennent :

- Des réactions allergiques sur la peau :
- Peu fréquent : éruption de boutons ou plaques, démangeaisons,
- Des réactions allergiques respiratoires :
- Rare : crise d'asthme,
- Effets indésirables fréquents : nausées, vomissements, difficulté pour digérer, douleurs abdominales, maux d'estomac.
- Effets indésirables peu fréquents : diarrhée, constipation, flatulence, inflammation de l'estomac (gastrite), maux de tête, étourdissements, somnolence, gonflement (œdème), fatigue.
- Effets indésirables rares : inflammation dans la bouche (stomatite), ulcère gastro-intestinal, inflammation de l'intestin (colite), sensation de fourmillements et de picotements, bourdonnements d'oreille, troubles de la vue (vision floue), prise de poids, diminution des globules rouges (anémie) due à un saignement, augmentation des enzymes hépatiques, maladie du foie (hépatite), augmentation de la bilirubine.

SIGNALER OBLIGATOIREMENT A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE OU GENANT QUI N'EST PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

SURDOSAGE :

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir immédiatement un médecin ou les urgences médicales.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Posologie :

La dose à utiliser dépend de la maladie traitée.
Elle est de 1 à 3 ampoules par jour (soit 100 à 300 mg par jour).
Votre médecin répartira votre dose en 2 ou 3 injections au cours de la journée.

Mode d'administration :

Ce médicament est utilisé par voie intramusculaire stricte.

- Les injections doivent être faites d'une façon rigoureusement aseptique dans la partie externe du quadrant supéro-externe de la fesse, profondément et lentement.
- Lorsqu'elles sont répétées, il est recommandé de changer de côté à chaque injection. Il est important d'aspirer avant d'injecter, afin de s'assurer que la pointe de l'aiguille n'est pas dans un vaisseau.
- En cas de fortes douleurs au moment de l'injection, arrêter celle-ci immédiatement.
- En cas de prothèse de hanche, l'injection doit être faite du côté opposé.

Durée de traitement

La durée du traitement par voie intramusculaire est de 2 à 3 jours.

- En cas de crises de coliques néphrétiques : 2 jours maximum.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :

A conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière.
Après ouverture : le produit doit être utilisé immédiatement.

Tableau C

Médicaments autorisés n° :

- 9093401 Boîte de 2 ampoules
- 9093402 Boîte de 5 ampoules

CECI EST UN MÉDICAMENT

Le médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin, le mode d'emploi et les instructions du pharmacien.

- Le médecin et le pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- N'en reprenez pas les doses sans consulter votre médecin.
- Ne pas laisser les médicaments à la portée des enfants.

CONSEIL DES MINISTRES ARABES DE LA SANTE

Titulaire/Exploitant/Fabricant
LABORATOIRES UNIMED
Z.I. Kalâa Kébira - BP : 38 - 4060 TUNISIE
Tél. : **(+ 216) 73 342 669**
Fax : **(+216) 73 342 472**
Site Web : www.unimed.com.tn

Edition : 04
Date : 06 / 2019
14KET201

كـتومـاد® 100

كيتوبروفين 100 مغ / 2 مل

محلول للحقن داخل العضلة

الشكل :

محلول للحقن داخل العضلة فقط، وحدة ذات 2 مل.

علبة تحتوي على وحدتين و 5 وحدات للحقن.

التركيبة :

كيتوبروفين 5غ

سواغات : كحول بنزيلي، أرجينين، حامض الستريك أحادي الإماهة، ماء صالح للحقن كافي لـ.......................... 100 مل

سواغ ذو أثر ملحوظ : كحول بنزيلي.

الصّنف العلاجي :

مضاد للروماتزم، مضاد (غير ستيرويدي) للإلتهاب.

دواعي الإستعمال :

تأتي من النشاط المسكن والمضاد للالتهاب من كيتوبروفين، من أهمية مظاهر عدم التحمل التي يثيرها الدواء ومن مكانه في مجموعة الأدوية المضادة للالتهابات المتاحة. حاليا تكون محدودة، لدى البالغين (أكثر من 15 سنة)، لـ :

- علاج الأعراض على المدى القصير من :
  - الروماتيزم الالتهابي،
  - الآلام الحادة في أسفل الظهر،
  - الآلام الجذرية
- علاج آلام الأورام.
- علاج نوبات المغص الكلوي.

موانع الاستعمال :

يمنع هذا الدواء في الحالات التالية :

- بعد 24 أسبوعا من انقطاع الطمث (5 أشهر من الحمل) (انظر الحمل والرضاعة)،
- فرط الحساسية للكيتوبروفين أو أي من السواغات،
- سوابق تفاعلات فرط الحساسية مثل تشنج القصبات، والربو، والتهاب الأنف، الشرى أو غيرها من الحساسية تجاه كيتوبروفين، حمض أسيتيل ساليسيليك أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأخرى. تم الإبلاغ عن تفاعلات تأقية شديدة، نادرا ما تكون مميتة لدى هؤلاء المرضى (انظر تأثيرات غير مرغوب فيها) ؛ نزيف أو انثقاب في الجهاز الهضمي خلال علاج سابق بمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية،
- النزيف المعدي المعوي، نزف دماغي وعائي أو نزيف آخر متطور،
- القرحة الهضمية التقدمية، أو سوابق القرحة المعوية أو النزف المتكرر (2 أو أكثر من نوبات النزف أو تقرح منفصل)،
- قصور كبدي حاد،
- قصور كلوي حاد،
- قصور قلبي شديد،
- اضطرابات في الإرقاء أو علاج مضاد للتخثر (موانع مرتبطة بالحقن العضلي).
- نظرا لوجود كحول البنزيل، يمنع هذا الدواء لدى الخدج والأطفال حديثي الولادة.

التحذيرات وإحتياطات الإستعمال :

توجه إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل استعمال كـتومـاد® في الحالات التالية :

- كان لديك الربو المرتبط بالبوليبات في الأنف أو التهاب الأنف أو الجيوب الأنفية (التهاب الأنف أو التهاب الجيوب الأنفية المزمن). تناول هذا الدواء قد يسبب صعوبة في التنفس أو نوبة ربو، خاصة عند الأشخاص الذين لديهم حساسية للأسبرين أو دواء مضاد للالتهاب غير استيرويدي (أنظر موانع الاستعمال)،
- لديك أمراض القلب (ارتفاع ضغط الدم و / أو فشل القلب) أو الكبد أو الكلية أو احتباس السوائل. اضطرابات التخثر. مرض التهاب الأمعاء (مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي)،
- تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي (مثل قرحة في المعدة أو إثني عشري قديم)،
- أنت بالفعل في علاج مع دواء يزيد من خطر الإصابة بأمراض القرحة الهضمية أو،
- لديك بالفعل رد فعل مبالغ فيه من الجلد إلى الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية (سرير السمرة).
- الأشخاص الذين يعانون من مخاطر القلب والأوعية الدموية.
- لديك مشاكل في القلب.
- تعرضت من قبل لسكتة دماغية.
- تعتقد أنك تعاني من عوامل خطورة للأمراض القلبية الوعائية (على سبيل المثال إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو الكلوسترول أو إذا كنت تدخن).

قد تزيد الأدوية مثل كـتومـاد® من خطر الإصابة بنوبة قلبية ("احتشاء عضلة القلب") أو السكتة الدماغية. يكون الخطر أكثر عندما تكون الجرعات المستخدمة عالية ومدة العلاج طويلة.

لا تتجاوز الجرعات الموصى بها أو مدة العلاج.

أوقف العلاج إستشر طبيبك على الفور :

- في حالة حدوث نوبة ربو أو صعوبة في التنفس بعد تلقي هذا الدواء. قد يكون علامة على وجود حساسية من هذا الدواء.
- إذا كان لديك طفح جلدي من البثور أو البقع على الجلد، والحكة، وتورم مفاجئ في الوجه والرقبة
- إذا كان لديك دم في فمك أو دم في البراز أو لون أسود. و يمكن بعد ذلك أن يكون النزيف الموضعي في المعدة و / أو الأمعاء (نزيف الجهاز الهضمي).
- إذا كنت تعاني من تقرح الجهاز الهضمي.
- أوقف العلاج وأخبر طبيبك إذا حدثت مشاكل في الرؤية (عدم وضوح الرؤية).
- أخبر طبيبك إذا كنت تعتقد أنك مصاب بعدوى (خاصة إذا كنت تعاني من الحمى)، أو إذا زادت الأعراض سوءا. مثل أي دواء مضاد للالتهاب غير الستيرويدي، قد يخفي كيتوبروفين أعراض العدوى.

إذا كنت من كبار السن أو إذا كان وزن جسمك منخفضا، فمن الأرجح أن تكون لديك آثار جانبية، و خاصة النزيف المعوي، والقرح و الثقوب.

سيطلب منك طبيبك إجراء فحص دم لمراقبة أداء الكليتين والكبد والقلب والحد من الجرعة.

• يحتوي هذا الدواء على 50 مغ/ 2 مل من كحول البنزيل. يمكن أن يسبب تفاعلات التأق عند الرضع و الأطفال حتى سن 3 سنوات.

في حالة وجود شك، لا تتوانوا في إستشارة الطبيب المباشر أو الصيدلاني.

التفاعلات الدوائية و تفاعلات أخرى :

- يجب عليك دائما إخبار طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت تستعمل أو تتلقى أي من الأدوية التالية قبل استعمال كـتومـاد® :

أدوية من نفس عائلة الكتومـاد® (الأسبرين، والعقاقير المضادة للالتهابات) التي تستخدم لتقليل الالتهاب والحمى و / أو لتخفيف الألم. الستيرويدات القشرية. العقاقير التي تحول دون تشكيل جلطات وسيولة الدم (مضادات التخثر الفموية مثل الوارفارين، الثرومبين مثبطات مثل دابيغاتران، مثبطات مباشرة للعامل العاشر كـأبيكسابان (apixaban)، ريفاروكسيبان و إدوكسابان (edoxaban)، مانع تكتس الصفيحات، الهيبارين عن طريق الحقن). إذا كان أخذ أي من هذه الأدوية ضروريا، يجب أن يراقبك الطبيب عن كثب بسبب زيادة خطر النزيف ؛ الليثيوم (يستخدم لبعض الاضطرابات المزاجية) ؛ بعض الأدوية المضادة للسرطان (بيميتريكسيد، ميثوتريكسات) ؛ العقاقير المستخدمة لتقليل الجهد وعلاج أمراض معينة من القلب (المحول للأنجيوتنسين مثبطات الإنزيم، مدرات البول، حاصرات بيتا، أنجيوتنسين II الخصوم، جليكوسيدات القلب و نيكورنديل (nicorandil) ؛ بعض مضادات الاكتئاب (مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية) ؛ دفرازيروكس (deferasirox) (يستخدم لخفض كمية الحديد في الدم) ؛ بعض الأدوية المثبطة للمناعة المستخدمة في حالة زرع الأعضاء (السيكلوسبورين، تاكروليموس).

ينبغي إعلام الطّبيب في حالة استعمال أدوية علاجيّة أخرى.

الحمل و الإرضاع:

الحمل:

خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحمل لا ينبغي النظر في وصف مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية إلا عند الضرورة. قد يحتاج طبيبك لوصف هذا الدواء إذا لزم الأمر.

بين شهرين ونصف ونهاية الشهر الخامس من الحمل (بالضبط بين 12 و 24 أسبوعا من انقطاع الطمث)، سيتم استعمال هذا الدواء فقط بناء على نصيحة طبيبك وباختصار. يمنع و بشدة الاستعمال المطول لهذا الدواء.

يمنع استعمال هذا الدواء بعد مرور الشهر الخامس.

الإرضاع :

تمر مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية عبر حليب الام لذا يجب ألا تُعطى للنساء اللواتي يرضعن.

في كافة الحالات إستشيري طبيبك المباشر.

السياقة واستعمال الآلات :

ينصح بعدم السياقة أو استعمال الآلات خلال فترة العلاج خاصة عند ظهور العوارض التالية : دوار، نعاس، اختلاج، اضطرابات بصريّة.

تأثيرات غير مرغوب فيها :

قد تزيد الأدوية مثل كـتومـاد® من خطر الإصابة بنوبة قلبية ("احتشاء عضلة القلب") أو السكتة الدماغية.

بشكل عام، تصنف وتيرة ردود الفعل السلبية على النحو التالي :

شائع جدا (أكثر من 1 من كل 10 أشخاص) متكرر (أكثر من 1 من كل 100 شخص وأقل من 1 من كل 10 أشخاص) غير شائع (أكثر من شخص واحد من بين كل 1000 شخص وأقل من شخص واحد من كل 100 شخص) نادر (أكثر من 1 من كل 10000 شخص وأقل من شخص واحد من بين كل 1000 شخص) نادرة جدا (أقل من 1 من كل 10000 شخص)

أوقف العلاج على الفور وأخبر طبيبك إذا حدثت ردود الفعل التالية:

- حساسية الجلد :
  - غير شائع : طفح البثور أو لويحات، حكة،
- حساسية الجهاز التنفسي :
  - نادر : نوبة ربو،
- الآثار الجانبية الشائعة : الغثيان، والتقيؤ، وصعوبة الهضم، وآلام في البطن، واضطراب المعدة.
- الآثار الجانبية غير المألوفة: الإسهال، والإمساك، وانتفاخ البطن، التهاب المعدة (التهاب المعدة)، والصداع، والدوخة، والنعاس، وتورم (الوذمة)، والتعب.
- الآثار الجانبية النادرة : التهاب الفم، قرحة المعدة والأمعاء، التهاب الأمعاء (التهاب القولون)، الإحساس بوخز، طنين، عدم وضوح الرؤية، زيادة الوزن، و انخفاض خلايا الدم الحمراء (الأنيميا) بسبب النزيف، و زيادة انزيمات الكبد، وأمراض الكبد (التهاب الكبد)، وزيادة البيليروبين.

يجب إعلام الطبيب أو الصيدلاني في حالة ظهور تأثيرات غير مرغوب فيها أو مقلقة أخرى غير مذكورة في هذه النشرة.

تجاوز الجرعة :

في حالة تجاوز الجرعة أو تسمم عارضي، اتصل فورا بطبيب أو بالطوارئ الطبية.

المقادير و طريقة الاستعمال :

المقادير:

تعتمد الجرعة المراد استعمالها على المرض الذي يتم علاجه.

وهي من 1 إلى 3 وحدات في اليوم (100 إلى 300 مغ يوميا).

سيقوم طبيبك بتقسيم الجرعة إلى 2 أو 3 حقن خلال اليوم.

طريقة الاستعمال :

يستعمل هذا الدواء عبرالعضلة فقط.

- يجب أن يتم الحقن بطريقة معقمة وبشكل صارم في الجزء الخارجي من رباعي الأوتار الفائق الخارجي، بشكل عميق وبطي.
- عند التكرار، يوصى بتغيير الجوانب عند كل حقنة. من المهم أن تستنشق قبل الحقن، للتأكد من أن طرف الإبرة ليس في الوعاء.
- توقف على الفور إذا أحسست بألم شديد وقت الحقن.
- يجب إجراء الحقن على الجانب الآخر في حالة وجود مفصل الورك.

مدة العلاج :

مدة العلاج عبر الحقن العضلي هو 2 إلى 3 أيام.

- في حالة نوبات المغص الكلوي لا تتجاوز مدة العلاج يومين.

الحفظ :

يحفظ هذا الدّواء بعيدا عن الحرارة و الضوء.

بعد الفتح : يجب استعمال الدواء على الفور.

جدول ج

التأشيرة :

- 9093401 علبة ذات وحدتين.
- 9093402 علبة ذات 5 وحدات.

إن هذا دواء

مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.

اتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

- الطبيب و الصيدلاني هما الخبيران بالد واء و بنفعه و ضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

صاحب التسجيل/المشغّل/المصنّع

مخابر يونيماد

المنطقة الصناعية القلعة الكبرى

ص.ب : 38 - 4060 تونس

الهاتف : 669 342 73 (216+)

الفاكس : 472 342 73 (216+)

موقع الواب : www.unimed.com.tn

نشرة : 04

تاريخ : 06 / 2019

14KET201