

PARAMED®

Paracétamol 1g/100 ml
Solution pour perfusion I.V.

Poches PVC & Poches multicouches de 100 ml & 50 ml avec suremballage en aluminium

FORME ET PRESENTATION :

Solution pour perfusion I.V. dosée à 1g /100 ml.
Solution claire et légèrement jaune à brun pâle.

- Boîte de 6 poches PVC de 50 ml avec suremballage en aluminium.
- Boîte de 6 poches PVC de 100 ml avec suremballage en aluminium.
- Boîte de 6 poches multicouches de 50 ml avec suremballage en aluminium.
- Boîte de 6 poches multicouches de 100 ml avec suremballage en aluminium.

COMPOSITION :

Paracétamol.....1 g
Excipients : glucose monohydraté, acide acétique glacial, acétate de sodium trihydraté, citrate de sodium dihydraté, acide chlorhydrique et/ou hydroxyde de sodium, eau PPI q.s.p.100 ml

Excipients à effet notoire : glucose, sodium.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Analgésique (calme la douleur) et antipyrétique (fait baisser la fièvre).

INDICATIONS :

PARAMED® est indiqué dans le traitement de courte durée des douleurs d'intensité modérée, en particulier en période post-opératoire et dans le traitement de courte durée de la fièvre, lorsque la voie intraveineuse est cliniquement justifiée par l'urgence de traiter la douleur ou l'hyperthermie et/ou lorsque d'autres voies d'administration ne sont pas possibles.

CONTRE-INDICATIONS :

- PARAMED® est contre-indiqué :
- en cas d'hypersensibilité au paracétamol ou au chlorhydrate de propacétamol (prodrogue du paracétamol) ou à l'un des excipients.
- en cas d'insuffisance hépato-cellulaire sévère.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Utiliser un traitement antalgique adapté par voie orale dès que cette voie d'administration est possible.
- En cas de maladie du foie ou des reins, ou d'abus d'alcool.
- En cas de prise d'autres médicaments contenant du paracétamol.
- En cas de problème de nutrition (malnutrition) ou de déshydratation.
- En cas de déficit en enzyme glucose-6-phosphate déshydrogénase (pouvant conduire à une anémie hémolytique, un trouble sanguin).
- Ce médicament contient 39,72 mg de sodium (composant principal du sel de cuisine/table) par poche de 50 ml, ce qui équivaut à 2 % de l'apport alimentaire quotidien maximal recommandé de sodium pour un adulte.
- Ce médicament contient 79,43 mg de sodium (composant principal du sel de cuisine/table) par poche de 100 ml, ce qui équivaut à 4 % de l'apport alimentaire quotidien maximal recommandé de sodium pour un adulte.
- Ce médicament contient 1,65 g de glucose par poche de 50 ml dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.
- Ce médicament contient 3,3 g de glucose par poche de 100 ml dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

Ce médicament contient du paracétamol : il est nécessaire d'en tenir compte en cas de prise d'autres médicaments à base de paracétamol, ou de **propacétamol**, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Informez votre médecin si vous prenez d'autres médicaments contenant du paracétamol ou du **propacétamol**.

Il faut envisager une réduction de doses en cas de traitement concomitant avec le probénécide. Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez des anticoagulants oraux. Des contrôles approfondis de l'effet des anticoagulants peuvent être nécessaires.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez de la flucoxaciline (antibiotique), en raison d'un risque grave d'anomalie sanguine et plasmatique (acidose métabolique à trou anionique élevé) qui doit faire l'objet d'un traitement urgent et qui peut survenir notamment en cas d'insuffisance rénale sévère, de septicémie (lorsque les bactéries et leurs toxines circulent dans le sang entraînant des lésions aux organes), de malnutrition, d'alcoolisme chronique et si les doses quotidiennes maximales de paracétamol sont utilisées.

Le salicylamide peut allonger la demi-vie d'élimination du paracétamol.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

PARAMED® avec les aliments et les boissons :

Sans objet.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Au besoin, PARAMED® peut être utilisé pendant la grossesse. En revanche, la dose la plus faible possible qui permette de soulager la douleur et/ou la fièvre doit être donnée pendant la durée la plus courte possible. Contactez votre médecin ou sage-femme si la douleur et/ou la fièvre ne diminuent pas ou si vous devez prendre le médicament plus fréquemment.

PARAMED® peut être utilisé pendant l'allaitement.

DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.

CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES :

Sans objet.

EFFETS INDESIRABLES :

- Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
- Dans de rares cas (plus de 1 personne sur 10 000 et moins d'une personne sur 1000), il est possible que survienne un malaise, une baisse de la tension artérielle ou des modifications biologiques : taux anormalement élevé des enzymes hépatiques, retrouvé lors d'un bilan sanguin. Dans ce cas, prévenez votre médecin car cela peut nécessiter un contrôle ultérieur du bilan sanguin.

- De très rares cas de réactions cutanées graves ont été signalés. Dans des cas très rares (moins de 1 personne sur 10 000, dont des cas isolés), il est possible que survienne une éruption cutanée ou une réaction allergique grave. Il faut immédiatement **arrêter le traitement** et avertir votre médecin.
- Dans des cas isolés, d'autres modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées : taux anormalement bas de certains éléments du sang (plaquettes, globules blancs) pouvant se traduire par des saignements de nez ou des gencives. Dans ce cas, prévenez votre médecin.
- Des cas de sensations de douleur et de brûlure au point d'injection ont été rapportés, pouvant être liées à une vitesse initiale de perfusion trop rapide, ne disparaissant pas nécessairement après la diminution du débit.
- Des cas de rougeur de la peau, de bouffées de chaleur, de démangeaisons et d'augmentation anormale du rythme cardiaque ont été rapportés.

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI N'EST PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

SURDOSAGE :

Dans les cas de surdosage, les symptômes apparaissent généralement dans les 24 premières heures et comprennent: nausées, vomissements, anorexie, pâleur, douleurs abdominales et un risque d'atteinte du foie. Demandez un avis médical immédiat en cas de surdosage à cause du risque d'atteinte hépatique irréversible.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Posologie :

La posologie est basée sur le poids du patient (voir le tableau des posologies ci-dessous)

Poids du patient	Dose par administration	Volume par administration	Volume maximal de PARAMED® par administration selon les limites supérieures de poids du groupe (ml) ***	Dose maximale journalière**
≤ 10 kg *	7,5 mg/kg	0,75 ml/kg	7,5 ml	30 mg/kg
> 10 kg à ≤ 33 kg	15 mg/kg	1,5 ml/kg	49,5 ml	60 mg/kg sans dépasser 2 g
> 33 kg à ≤ 50 kg	15 mg/kg	1,5 ml/kg	75 ml	60 mg/kg sans dépasser 3 g
> 50 kg avec facteurs de risque supplémentaires d'hépatotoxicité	1 g	100 ml	100 ml	3 g
> 50 kg sans facteur de risque supplémentaire d'hépatotoxicité	1 g	100 ml	100 ml	4 g

* Nouveau-nés prématurés : Aucune donnée de sécurité et d'efficacité n'est disponible pour les nouveau-nés prématurés.

** Dose maximale journalière : la dose maximale journalière telle que présentée dans le tableau ci-dessus concerne les patients qui ne reçoivent pas d'autres produits contenant du paracétamol ; elle doit être ajustée en conséquence en tenant compte de tels produits.

*** Les patients pesant moins nécessiteront des volumes inférieurs.

L'intervalle minimal entre chaque administration doit être d'au moins 4 heures.

Chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère, l'intervalle minimal entre chaque administration doit être d'au moins 6 heures.

Le nombre de doses administrées sur 24 heures ne doit pas dépasser 4.

Mode d'administration :

RISQUE D'ERREURS MEDICAMENTEUSES Prenez soin à éviter les erreurs de dosage dues à une confusion entre milligrammes (mg) et millilitres (ml), qui pourraient provoquer un surdosage accidentel et un décès.

Voie intraveineuse

La solution de paracétamol est administrée en perfusion intraveineuse de 15 minutes.

Poche de 50 ml :

Le médicament peut également être dilué dans du chlorure de sodium à 0,9% ou du glucose à 5% jusqu'à un facteur 10 (un volume de PARAMED® dans neuf volumes de diluant).

Si vous avez l'impression que l'effet de PARAMED® est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin.

Si vous oubliez d'utiliser PARAMED® : Sans objet.

Si vous arrêtez d'utiliser PARAMED® : Sans objet.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MODALITES DE MANIPULATION/ELIMINATION :

- Avant toute administration, le produit doit être visuellement contrôlé pour détecter toute particule.

- La solution diluée doit être contrôlée visuellement et ne doit pas être utilisée en présence d'opalescence, de particules visibles ou de précipité.

- A usage unique, toute solution non utilisée doit être éliminée.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION :

- Avant ouverture du suremballage : A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

- Après ouverture du suremballage : Une utilisation immédiate est recommandée. Toutefois, la stabilité du produit à la lumière a été démontrée pendant au moins 24 heures.

Médicaments autorisés N° :

- PARAMED® poche PVC de 50 ml : 9093801
- PARAMED® poche PVC de 100 ml : 9093802
- PARAMED® poche multicouches de 100 ml : 9093803
- PARAMED® poche multicouches de 50 ml : 9093804

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Ceci est un produit qui affecte la santé et le non-respect du mode d'administration vous met en danger.
- Suivez attentivement la prescription du médecin, le mode d'emploi et les conseils du pharmacien.
- Le médecin et le pharmacien sont les experts du médicament et savent ses bénéfices et ses risques.
- N'arrêtez pas la prise du traitement de votre propre initiative.
- Ne renouvelez pas l'approvisionnement en ce médicament sans revenir au médecin.
- Ne laissez pas les médicaments à la portée des enfants.

CONSEIL DES MINISTRES ARABES DE LA SANTE



Titulaire/Exploitant/Fabricant
UNIMED
Z.I. Kalâa Kébira - BP : 38 - 4060 TUNISIE
Tél. : (+ 216) 70 029 501 – Fax : (+216) 73 342 472
Site Web : www.unimed.com.tn

Edition : 04
Date : 09 / 2024
14PRM401

Titre :	PARAMED®
Version :	04
Date de réalisation :	23/04/2024
Dimension	210 x 290 mm
Destination (Pays..) :	TUNISIE

باراماد®

باراسيتامول غ / 100 مل

محلول للإرواء داخل الوريد

أكياس PVC & أكياس متعددة الطبقات ذات 100 مل & 50 مل في غلاف خارجي من الألومينيوم

الشكل :

محلول للإرواء داخل الوريد بنسبية 1غ /100 مل.

محلول صاف و أصفر قليلا إلى بَنِّي باهت.

- غلبة تحتوي على 6 أكياس PVC ذات 50 مل في غلاف خارجي من الألومينيوم.

- غلبة تحتوي على 6 أكياس PVC ذات 100 مل في غلاف خارجي من الألومينيوم.

- غلبة تحتوي على 6 أكياس متعددة الطبقات ذات 50 مل في غلاف خارجي من الألومينيوم.

- غلبة تحتوي على 6 أكياس متعددة الطبقات ذات 100 مل في غلاف خارجي من الألومينيوم.

التركيبية :

باراسيتامول

سواغات : غلوكوز أحادي الإماهة، حمض الأسيتيك الثلجي، أمينات الصوديوم ثلاثي الإماهة، سترات الصوديوم ثنائي

الإماهة، هيدروكسيد الصوديوم و/أو حمض الهيدروكلوريك، ماء صالح للحقن كاف لـ.....100 مل

سواغات ذات أثر ملحوظ : غلوكوز، صوديوم.

الصفن العلاجي :

مسكن (مهدي للآلام) و مضاد للحمى (خافض للحرارة).

دواعي الإستعمال :

يوصف باراماد® للعلاج لمدة وجيزة لآلام معتدلة خاصة ما بعد الجراحة، وللحمى وذلك عندما يكون الحقن داخل الوريد مبررا بضرورة العلاج السريع للآلام أو لإرتفاع الحرارة و / أو عندما لا يمكن العلاج عبر سبل أخرى.

موانع الاستعمال : يمنع استعمال باراماد®:

- في حالة فرط الحساسية لباراسيتامول أو لبروياسيتامول هيدروكلوريد (من سلانف الباراسيتامول) أو لأحد سواغات هذا الدواء.

- في حالة قصور كبدِي خلوي حاد.

التحذيرات و احتياطات الاستعمال :

- عليك استعمال علاج مسكن للآلام عبر الفم ما إن أمكن ذلك.

- في حالة مرض في الكبد أو في الكلى أو عند تعاطي الكحول.

- عند استعمال أدوية أخرى محتوية على الباراسيتامول.

- في حالة مشكل في التغذية (سوء التغذية) أو جفاف الماء في الجسم.

- في حالة نقص إنزيم الغلوكوز-6-فوسفات ديهيدروجيناز (الذي يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم الانحلالي، اضطراب في الدم).

يحتوي هذا الدواء على 39.72 مغ من الصوديوم (المكون الرئيسي لملح المطبخ / الطاوله) لكل كيس ذي 50 مل، وهو ما يعادل 2 % من الحد الأقصى من الكمية الغذائية اليومية الموصى بها للبالغ.

يحتوي هذا الدواء على 79.43 مغ من الصوديوم (المكون الرئيسي لملح المطبخ / الطاوله) لكل كيس ذي 100 مل، وهو ما يعادل 4% من الحد الأقصى من الكمية الغذائية اليومية الموصى بها للبالغ.

يحتوي هذا الدواء على 1.65 غ من الغلوكوز لكل كيس ذي 50 مل، لذا يجب اخذ هذا بعين الاعتبار في الحصه اليومية في حالة اتباع نظام غذائي منخفض السكر أو لمرضى السكري.

يحتوي هذا الدواء على 3.3 غ من الغلوكوز لكل كيس ذي 100 مل، لذا يجب اخذ هذا بعين الاعتبار في الحصه اليومية في حالة اتباع نظام غذائي منخفض السكر أو لمرضى السكري.

التفاعلات الدوائية وتفاعلات أخرى :

يحتوي هذا الدواء على الباراسيتامول : يجب الأخذ بعين الإعتبار في حالة إستعمال أدوية أخرى محتوية على الباراسيتامول أو البروياسيتامول لتجنب تجاوز الجرعة اليومية المحددة. أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أدوية علاجية أخرى تحتوي على الباراسيتامول أو البروياسيتامول.

ينبغي تخفيض الجرعة في حالة العلاج المتزامن مع البروبيينسيد.

يرجى إخبار طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت تتناول مضادات التخثر عن طريق الفم. قد يكون من الضروري إجراء فحوصات معقّدة لتأثير مضادات التخثّر.

يرجى اخبار طبيبك أو الصيدلاني اذا كنت تتناول الفلوكلوكزاسيلين (مضاد حيوي)، بسبب خطر جدي في الدم و البلازما (ارتفاع الحمض الاستقلابي مع فجوة انيونيّة مرتفعة) الذي يتطلب علاجاً عاجلاً و الذي يمكن ان يحدث خاصة في حالات الفشل الكلوي الحاد، تسمم الدم (عندما تنتشر البكتيريا و سمومها في الدم مما يتسبب في تلف الأعضاء)، سوء التغذية، إدمان الكحول المزمن و اذا تم استخدام الجرعات اليومية القصوى من الباراسيتامول. قد يمدد السليولاميد من نصف عمر التخلص من الباراسيتامول.

لتجنب التفاعلات بين مختلف الأدوية، ينبغي إعلام الطبيب أو الصيدلاني في حالة استعمال أدوية علاجية أخرى.

استعمال باراماد® مع الماكولات والمشروبات : لا شيء.

الحمل و الإرضاع :

إذا كنت حاملا أو مرضعة، قد تكونين حاملا أو تخططين لإنجاب طفل، اطلبي من طبيبك أو الصيدلاني النصيحة قبل تناول هذا الدواء.

إذا لزم الأمر، يمكن إستعمال الباراماد® أثناء الحمل. ومع ذلك، يجب إعطاء أقل جرعة ممكنة لتخفيف الألم و / أو الحمى لأقصى وقت ممكن. اتصلي بطبيبك أو الممرضة إذا لم ينخفض الألم و / أو الحمى أو إذا كنت بحاجة إلى تناول الدواء بشكل متكرر.

يمكن إستعمال باراماد® أثناء الرضاعة الطبيعية.

اطلبي نصيحة طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.

السياقة و إستعمال الآلات : لا شيء.

تأثيرات غير مرغوب فيها :

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارا غير مرغوب فيها، على الرغم من عدم حصول الجميع عليها.

• في حالات نادرة (أكثر من 1 من بين 10 000 شخص وأقل من 1 من كل 1000 شخص)، قد تشعر بتوعك، انخفاض في ضغط الدم أو تغيرات بيولوجية : ارتفاع غير طبيعي في مستوى إنزيمات الكبد، تم العثور عليه أثناء اختبار توازن الدم. في هذه الحالة، أخبر طبيبك لأن هذا قد يتطلب اختيارا لاحقا لتوازن الدم.

• تم الإبلاغ عن حالات نادرة جدا من التفاعلات الجلدية الخطيرة. في حالات نادرة جدا (أقل من 1 من بين 10 000 شخص، بما في ذلك حالات معزولة)، من الممكن أن يحدث طفح جلدي أو تفاعل أرجي شديد. **توقف عن العلاج على الفور** وأخبر طبيبك.

• في الحالات المعزولة، لوحظت تغيرات بيولوجية أخرى تتطلب مراقبة لتوازن الدم : مستويات انخفاض غير طبيعي لبعض عناصر الدم (الصفائح الدموية وكريات الدم البيضاء) والتي قد تؤدي إلى نزيف في الأنف أو اللثة. في هذه الحالة، أخبر طبيبك.

• تم الإبلاغ عن حالات ألم وحرقة في موقع الحقن، قد تكون مرتبطة بمعدل ارواء بدني سريع للغاية، و التي لا تختفي بالضرورة بعد خفض معدل الإرواء.

• تم الإبلاغ عن احمرار في الجلد، هيّة الحرارة، حكة و زيادة غير طبيعية في معدل نبض القلب.

يجب إعلام الطبيب أو الصيدلاني في حالة ظهور تأثيرات أخرى غير مرغوب فيها و مقلقة غير مذكورة في هذه النشرة.

تجاوز الجرعة :

في حالة تجاوز الجرعة، عادة ما تظهر العوارض خلال 24 ساعة الأولى، منها : غثيان، قيء، إنعدام الشهية، شحوب، آلام البطن وخطر تلف الكبد. استشر طبيبك فوراً في حالة تناول جرعة زائدة بسبب خطر تلف الكبد الذي لا يمكن إصلاحه.

المقادير و طريقة الإستعمال :

المقادير :

تعتمد الجرعة على وزن المريض (انظر جدول الجرعات أدناه)

وزن المريض	الجرعة للإستعمال الواحد	الكمية للإستعمال الواحد	الكمية القصوى الباراماد® لكل استعمال وفقا لحدود وزن المجموعة العليا *** (مل)	الجرعة اليومية القصوى**
≥ 10كغ*	7.5 مغ/كغ	0.75 مل/كغ	7.5 مل	30 مغ/كغ
< 10 كغ إلى ≥ 33 كغ	15 مغ/كغ	1.5 مل/كغ	49.5 مل	60 مغ/كغ بدون تجاوز2 غ
< 33 كغ إلى ≥ 50 كغ	15 مغ/كغ	1.5 مل/كغ	75 مل	60 مغ/كغ بدون تجاوز3 غ
< 50 مع عوامل خطر إضافية للتسمم الكبدِي	1 غ	100 مل	100 مل	3 غ
< 50 بدون عوامل خطر إضافية للتسمم الكبدِي	1 غ	100 مل	100 مل	4 غ

*الأطفال الخدج : لا تتوفر معلومات السلامة والفعالية للأطفال الخدج.

** الجرعة اليومية القصوى : الجرعة اليومية القصوى كما هو موضح في الجدول أعلاه تتعلق بالمرضى الذين لا يتلقون أدوية أخرى تحتوي على الباراسيتامول؛ يجب تعديلها وفقا لذلك مع مراعاة هذه الأدوية.

*** يحتاج المرضى الذين يزنون أقل إلى كميات أقل.

ينبغي أن يكون الحد الأدنى للفاصل الزمني بين كل استعمال 4 ساعات على الأقل.

لدى المرضى الذين يعانون من قصور كلوي حاد، يجب أن يكون الحد الأدنى للفاصل الزمني بين كل استعمال 6 ساعات على الأقل.

يجب ألا يتجاوز عدد الجرعات خلال 24 ساعة 4 جرعات.

خطر الأخطاء الدوائية
احرص على تجنب أخطاء تقدير الجرعات بسبب الخلط بين المليلغرامات (مغ) والمليتر (مل)، والتي يمكن أن تسبب جرعة مفرطة عرضية و الموت.

عن طريق الحقن الوريدي

يتم إعطاء محلول الباراسيتامول كإرواء داخل الوريد لمدة 15 دقيقة.

كيس 50 مل :

يمكن أيضا تخفيف الدواء في كلوريد الصوديوم 0.9 % أو غلوكوز 5 % حتى عامل 10 (كمية واحدة من باراماد® في تسعة كميات من المادة المخففة).

إذا كان لديك انطباع بأن تأثير محلول باراماد® قوي جدا أو ضعيف جدا، استشر طبيبك.

إذا نسيت استعمال باراماد® : لا شيء.

إذا توقفت عن استعمال باراماد® : لا شيء.

في حالة وجود شك، يجب استشارة الطبيب المباشر أو الصيدلاني.

طرق التحضير/ الإلغاء :

- قبل كل استعمال، يجب فحص المحلول بصريًا للتثبت من عدم وجود أي جسيم.

- يجب فحص المحلول المخفف بصريا ولا يجب استعماله في حالة وجود غموم، جسيمات مرئية أو رُسابة.

- للإستعمال الأحادي، يجب التخلص كل محلول لم يقع استعماله.

الحفظ :

- قبل فتح الغلاف الخارجي : يحفظ في درجة حرارية لا تتجاوز 25 درجة مائوية.

- بعد فتح الغلاف الخارجي : يجب استعمال الدواء فوراً. ومع ذلك، فقد تم إيضاح ثبات الدواء في الضوء لمدة 24 ساعة على الأقل.

التأشيرة :

• باراماد® أكياس PVC ذات 50 مل : 9093801

• باراماد® أكياس PVC ذات 100 مل : 9093802

• باراماد® أكياس متعددة الطبقات ذات 100 مل : 9093803

• باراماد® أكياس متعددة الطبقات ذات 50 مل : 9093804

إن هذا دواء

- هذا مستحضر يؤثر على صحتك و استعماله خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلاني الذي صرفه لك.

- الطبيب و الصيدلاني هما الخبيران بادواء و نفعه و ضرره.

- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

- لا تكثر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.

- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

صاحب التسجيل/الممثل/المصنّع

يونيماد

المنطقة الصناعية القلعة الكبرى ص.ب: 38 - 4060 تونس

الهاتف : 70 029 501 (216)+ - الفاكس : 73 342 472 (216)+

موقع الواب : www.unimed.com.tn



Titre :	PARAMED®
Version :	04
Date de réalisation :	23/04/2024
Dimension	210 x 290 mm
Destination (Pays.) :	TUNISIE