

# UNICROM 3M® 2% ET 4%

Cromogliciate de sodium  
Collyre, flacon en 3 modules de 5 ml

## FORME ET PRÉSENTATION :

Collyre stérile. Boîte de un flacon en 3 modules de 5 ml.

## COMPOSITION :

### • UNICROM 3M® 2% :

Cromogliciate de sodium..... 2 g

Excipients : Chlorure de benzalkonium, édétate de sodium, eau purifiée q.s.p ..... 100 ml

### • UNICROM 3M® 4% :

Cromogliciate de sodium..... 4 g

Excipients : Chlorure de benzalkonium, édétate de sodium, hydroxyde de sodium et/ou acide chlorhydrique, eau purifiée q.s.p ..... 100 ml

• **Excipient à effet notoire :** Chlorure de benzalkonium.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Antiallergique local.

## INDICATIONS :

### • UNICROM 3M® 2% :

Traitement symptomatique des affections ophtalmiques d'origine allergique.

### • UNICROM 3M® 4% :

- Traitement symptomatique des affections ophtalmiques d'origine allergique.

- Traitement des kératoconjunctivites printanières.

- Traitement des conjunctivites printanières.

- Traitement des kératites printanières.

## CONTRE-INDICATIONS :

Hypersensibilité au cromogliciate de sodium ou à l'un des constituants du collyre.

## MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

### D'EMPLOI :

- NE PAS INJECTER, NE PAS AVALER.

- Ne pas dépasser la posologie recommandée.

- **En l'absence d'amélioration comme en cas de persistance des symptômes, prendre un avis médical.**

- Ce médicament contient 0,1 mg/mL de chlorure de benzalkonium. Le chlorure de benzalkonium peut être absorbé par les lentilles de contact souples et changer leur couleur. Retirer les lentilles de contact avant application et attendre au moins 15 minutes avant de les remettre. Le chlorure de benzalkonium peut également provoquer une irritation des yeux, surtout si vous souffrez du syndrome de l'œil sec ou de troubles de la cornée (couche transparente à l'avant de l'œil). En cas de sensation anormale, de picotements ou de douleur dans les yeux après avoir utilisé ce médicament, contacter votre médecin.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET

## AUTRES INTERACTIONS :

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, instiller les collyres à 15 minutes d'intervalle.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

**Grossesse :** L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse.

**Allaitement :** L'allaitement est possible en cas de traitement par ce médicament.

**DANS TOUS LES CAS, DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN.**

## CONDUITES ET UTILISATION DE MACHINE :

Possibilité de gêne visuelle passagère liée à l'instillation du collyre. Dans ce cas, il convient pendant toute la durée du traitement d'attendre la fin des symptômes pour conduire un véhicule ou utiliser une machine.

## EFFETS INDÉSIRABLES :

Possibilité de survenue de réactions d'hypersensibilité au cromogliciate de sodium ou à l'un des constituants du collyre, et de gêne visuelle passagère après instillation du collyre.

**SIGNALER OBLIGATOIREMENT A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE OU GENANT QUI N'EST PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.**

## SURDOSAGE :

En cas de surdosage, rincer au sérum physiologique stérile.

## POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

### Posologie :

#### • Voie oculaire :

##### Adulte :

- 1 goutte dans chaque œil, 2 à 6 fois par jour.

- Chez l'enfant, un avis médical est nécessaire.

### Mode d'administration :

- Se laver soigneusement les mains avant instillation.

- Eviter de toucher l'œil ou les paupières avec l'embout du flacon.

- Instiller la goutte de collyre dans le cul-de-sac conjonctival inférieur de l'œil en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas.

- Reboucher le flacon immédiatement après usage.

- En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre 15 minutes entre chaque instillation.

**SE CONFORMER OBLIGATOIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE VOTRE MEDECIN.**

## PRECAUTIONS PARTICULIÈRES DE

## CONSERVATION :

• Conserver à une température inférieure à 30°C et à l'abri de la lumière.

• Tout flacon entamé doit être utilisé dans les 15 jours.


### Médicaments autorisés N° :

• UNICROM 3M® 2% : 9093055

• UNICROM 3M® 4% : 9093056



Se laver soigneusement les mains.



Dévisser le Bouchon.



Retourner le flacon, appuyer légèrement au milieu et instiller dans le cul-de-sac conjonctival inférieur de l'œil en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas.

## CECI EST UN MÉDICAMENT

- Ceci est un produit qui affecte la santé et le non-respect du mode d'administration vous met en danger.
- Suivez attentivement la prescription du médecin, le mode d'emploi et les conseils du pharmacien.
- Le médecin et le pharmacien sont les experts du médicament et savent ses bénéfices et ses risques.
- N'arrêtez pas la prise du traitement de votre propre initiative.
- Ne renouvelez pas l'approvisionnement en ce médicament sans revenir au médecin.
- Ne laissez pas les médicaments à la portée des enfants.

CONSEIL DES MINISTRES ARABES DE LA SANTE



Titulaire/Exploitant/Fabricant

**UNIMED**

Z.I. Kalâa Kébira - BP : 38 - 4060 TUNISIE  
Tél. : (+216) 70 029 501 - Fax : (+216) 73 342 472  
Site Web: www.unimed.com.tn

Edition : 02

Date : 11 / 2024

14UCR501

Titre :	<b>UNICROM 3M® 2% ET 4%</b>
Version :	02
Date de réalisation :	21/11/2024
Dimension	<b>120 x 240 mm</b>
Destination (Pays....) :	<b>TUNISIE</b>

# يونيكروم 3م<sup>®</sup> 2% & 4%

كروم غليكات الصوديوم  
قطرات للعين، قارورة ذات 3 مكونات ذات 5 مل

## الشكل :

قطرات معقمة للعين. علبة تحتوي على قارورة ذات 3 مكونات ذات 5 مل.  
التركيبية :

## • يونيكروم 3م<sup>®</sup> 2% :

كروم غليكات الصوديوم..... 2 غ  
سواغات: كلوريد البنزلكونيوم، إيديتات الصوديوم، ماء منقى كاف لـ:..... 100 مل

## • يونيكروم 3م<sup>®</sup> 4% :

كروم غليكات الصوديوم..... 4 غ  
سواغات: كلوريد البنزلكونيوم، إيديتات الصوديوم، هيدروكسيد الصوديوم و/أو حمض الهيدروكلوريك، ماء منقى كاف لـ:..... 100 مل

## • سواغ ذو أثر ملحوظ : كلوريد البنزلكونيوم.

## المنصف العلاجي :

مضاد موضعي للأرجية.

## دواعي الاستعمال :

## • يونيكروم 3م<sup>®</sup> 2% :

يستعمل هذا الدواء في علاج أمراض العيون الناجمة عن فرط الأرجية.

## • يونيكروم 3م<sup>®</sup> 4% :

يستعمل هذا الدواء في علاج أمراض العيون الناجمة عن فرط الأرجية.

- علاج التهاب القرنية والملتحمة الريبجية.

- علاج التهاب الملتحمة الريبجية.

- علاج التهاب القرنية الريبجية.

## موانع الاستعمال :

فرط الحساسية لكروم غليكات الصوديوم أو لأحد مكونات الدواء.

## التحذيرات و احتياطات الاستعمال :

- لا يجب حقنه أو تجرعه.

- لا تتجاوز الجرعة المحددة.

- استشر طبيبك في حالة عدم تحسن الحالة أو استمرار العوارض.

- يحتوي هذا الدواء على 0.1 مغ من كلوريد البنزلكونيوم بكل مل.

يمكن لكلوريد البنزلكونيوم أن يمتص من قبل العدسات اللاصقة اللينة و يغير لونها. أزل العدسات اللاصقة قبل التقطير و انتظر 15 دقيقة على الأقل قبل وضعها مرة أخرى.

يمكن أن يسبب كلوريد البنزلكونيوم تهيج العين أيضا، خاصة إذا كنت تعاني من متلازمة جفاف العين أو اضطرابات القرنية (طبقة شفافة في مقدمة العين).

إذا شعرت بإحساس غير طبيعي، وخز أو ألم في عينيك بعد استعمال هذا الدواء، اتصل بطبيبك.

## التفاعلات الدوائية و تفاعلات أخرى :

عند استعمال قطرات أخرى للعين، إنتظر 15 دقيقة قبل العلاج الثاني.

## الحمل و الإرضاع :

الحمل : لا ينصح باستعمال هذا الدواء خلال فترة الحمل.

الإرضاع : يمكن الإرضاع في حالة العلاج بهذا الدواء.

في كافة الحالات إستشيري طبيبك المباشر.

## السياقة و استعمال الآلات :

- يمكن حدوث اضطراب بصري طفيف بعد تقطير الدواء. لذلك لا يجب القيادة أو استعمال الآلات إلا بعد زوال هذه العوارض.

## تأثيرات غير مرغوب فيها :

إمكانية ظهور فرط حساسية لكروم غليكات الصوديوم أو لأحد مكونات الدواء و اضطرابات بصرية عابرة بعد تقطير الدواء.

يجب إعلام الطبيب أو الصيدلاني في حالة ظهور تأثيرات غير مرغوب فيها أو مزعجة أخرى غير مذكورة في هذه النشرة.

## تجاوز الجرعة :

في حالة تجاوز الجرعة اشطف بمحلول ملحي فيزيولوجي معقم.

## المقادير و طريقة الاستعمال :

## المقادير :

## • للتقطير داخل العين :

## الكبول :

- قطرة واحدة من قطرات للعين من مرتين إلى 6 مرات في اليوم.

- يجب إستشارة الطبيب عند استعمال هذا الدواء لدى الأطفال.

## طريقة الاستعمال :

- غسل اليدين جيدا قبل التقطير.

- تقادي تمان طرف القطارة مع العين أو الجفون.

- قطر قطرة واحدة من يونيكروم 3م<sup>®</sup> داخل ربة الملتحمة السفلى للعين وذلك بالنظر إلى أعلى و جذب الجفن السفلي قليلا إلى الأسفل.

- إحكام غلق القارورة مباشرة بعد كل استعمال.

في حالة الاستعمال المتزامن مع قطرات أخرى للعين، باعد بين عمليتي التقطير بـ 15 دقيقة.

يجب الالتزام بدقة بتعليمات الطبيب المباشر.

## الحفظ :


• يحفظ في درجة حرارية أقل من 30 درجة مئوية و بعيدا عن الضوء.

• يجب استعمال القارورة خلال 15 يوما من تاريخ فتحها.

## التاسيرة :

• يونيكروم 3م<sup>®</sup> 2% : 9093055

• يونيكروم 3م<sup>®</sup> 4% : 9093056



إغسل يديك جيّدا

إنزع الغطاء

إقلب القارورة واضغط على وسطها بلين، لتنتزل القطرة في العين، قطر داخل ربة الملتحمة السفلى للعين وذلك بالنظر إلى أعلى و جذب الجفن السفلي قليلا إلى الأسفل.

## إن هذا دواء

- هذا مستحضر يؤثر على صحتك و استعماله خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلاني الذي صرفه لك.
- الطبيب و الصيدلاني هما الخبيران بالدواء و يتفقه و ضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

نشرة : 02  
تاريخ : 2024 / 11 / 11  
14UCR501

صاحب التسجيل/المشغل/المصنّع  
يونيماد

المنطقة الصناعية القلعة الكبرى ص.ب : 38 - 4060 تونس  
الهاتف : (+216) 70 029 501 - الفاكس : (+216) 73 342 472  
موقع الواب : www.unimed.com.tn

unimed  
Laboratoires

Titre :	UNICROM 3M <sup>®</sup> 2% ET 4%
Version :	02
Date de réalisation :	21/11/2024
Dimension	120 x 240 mm
Destination (Pays....) :	TUNISIE