BETANYL®

Sulfate de terbutaline 5 mg / 2 ml
Solution pour inhalation par nébuliseur

FORME ET PRÉSENTATION :
Solution pour inhalation par nébuliseur.
Boite de 50 unidoses stériles de 2 ml en sachets en aluminium de 10 unidoses.
COMPOSITION :
Sulfate de terbutaline..... 250 mg
Excipients : chlorure de sodium, édétate de sodium, acide chlorhydrique, eau purifiée q.s.p…….. 100 ml
PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES :
AGONISTES SELECTIFS BETA 2 ADRENERGIQUES.
Ce médicament est un bêta2 mimétique à action rapide et de courte durée.
C'est un broncho-dilatateur (il augmente le calibre des bronches).
INDICATIONS :
- Traitement symptomatique des asthmes aigus graves.
- Traitement des poussées aiguës des bronchopneumopathies chroniques obstructives de l'adulte.

En association avec un traitement anti-inflammatoire continu comme les corticoïdes inhalés ou les antagonistes du récepteur aux leucotriènes.
Remarque : l'asthme aigu grave nécessite une hospitalisation en unité de soins intensifs.
Une oxygénothérapie et une corticothérapie par voie systémique doivent être associées au traitement bronchodilatateur.
CONTRE-INDICATIONS :
- Intolérance à ce médicament (survenue de toux ou de bronchospasme après inhalation du produit). Dans ce cas, il conviendra d'interrompre ce traitement et de prescrire d'autres thérapeutiques ou d'autres formes d'administration.
- Antécédent d'hypersensibilité (allergie) à la terbutaline ou à l'un des constituants.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
Mises en garde :
L'administration de terbutaline à l'aide d'un nébuliseur doit être réservée aux situations aiguës graves nécessitant l'inhalation d'une grande quantité du produit.
Ces situations nécessitent une surveillance médicale avec possibilité de mise en place d'une réanimation (abord veineux et assistance respiratoire) ; une oxygénothérapie et une corticothérapie par voie systémique doivent généralement y être associées.
Il est nécessaire d'associer un traitement anti-inflammatoire continu comme les corticoïdes inhalés ou les antagonistes des récepteurs des leucotriènes chez les patients avec un asthme persistant pour lesquels un traitement continu par bêta2 mimétiques est requis. Ces patients doivent être avisés de continuer à prendre leur traitement anti-inflammatoire après l'initiation de BETANYL® même lorsque les symptômes diminuent. Si les symptômes persistent ou si le traitement par bêta2 mimétiques nécessite d'être augmenté, ceci indique une aggravation sous-jacente de la maladie et le traitement doit être réajusté.
Des effets cardiovasculaires peuvent être observés avec les médicaments sympathomimétiques, y compris BETANYL® : survenue de rares cas d'ischémie myocardique en lien avec l'utilisation des bêta2-mimétiques. Les patients traités par BETANYL® et présentant des pathologies cardiaques sévères (cardiopathie ischémique, arythmie ou insuffisance cardiaque sévère) doivent être informés de prendre un avis médical s'ils ressentent une douleur thoracique ou tout autre symptôme témoignant d'une aggravation de leur pathologie cardiaque. Une attention particulière doit être apportée aux symptômes tels qu'une dyspnée ou une douleur thoracique car ceux-ci peuvent être d'origine respiratoire ou cardiaque.

Précautions particulières d'emploi
En cas d'infection bronchique ou de bronchorrhée abondante, un traitement approprié est nécessaire afin de favoriser la diffusion optimale du produit dans les voies respiratoires.
Ce médicament doit être administré avec prudence en cas d'hyperthyroïdie, en cas d'affection cardiovasculaire, notamment cardiomyopathie obstructive, troubles coronariens, troubles du rythme, hypertension artérielle, et en cas de diabète sucré.
Les bêta-2-mimétiques à forte dose peuvent être à l'origine d'une hypokaliémie pouvant favoriser la survenue de troubles du rythme cardiaque. Une surveillance de la kaliémie est recommandée dans la mesure du possible, en particulier lors de l'administration simultanée de thérapeutiques hypokaliémiantes, en cas d'hypoxie ou chez les sujets chez qui le risque de survenue de torsades de pointes est majoré (QT long ou traitements susceptibles d'augmenter le QTc).
Les bêta-bloquants (y compris ceux sous forme de collyres) peuvent inhiber partiellement ou totalement l'effet des bêta2stimulants.
Sportifs
Cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :
- **Associations déconseillées**
  + Halothane
  En cas d'intervention obstétricale, majoration de l'inertie utérine avec risque hémorragique ; par ailleurs, risque de survenue de troubles du rythme ventriculaire graves, par augmentation de la réactivité cardiaque.
  Interrompre le traitement par bêta-2 mimétiques si l'anesthésie doit se faire sous halothane.
- **Associations faisant l'objet de précautions d'emploi**
  + Antidiabétiques
  Elévation de la glycémie par effet bêta-stimulant.
  Renforcer la surveillance sanguine et urinaire. Passer éventuellement à l'insuline.
  + Agents entrainant une déplétion potassique
  En raison de l'effet hypokaliémiant des bêta2-mimétiques, l'administration concomitante d'agents entraînant une déplétion potassique connus pour aggraver le risque d'hypokaliémie, comme les diurétiques, la digoxine, les méthyl-xanthines et les corticostéroïdes doit être effectuée avec prudence après une évaluation minutieuse des bénéfices et des risques avec une attention particulière pour l'augmentation du risque d'arythmies cardiaques résultant d'une hypokaliémie. L'hypokaliémie prédispose également à la toxicité de la digoxine.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :
Grossesse : Ce médicament dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé, pendant la grossesse.
BETANYL®, lorsqu'il est utilisé tous les jours et non en cas de besoin, doit être utilisé avec prudence en fin de grossesse car il provoque un relâchement de l'utérus.
Lors de l'administration pendant la grossesse :
Une accélération du rythme cardiaque fœtal peut être observée parallèlement à la tachycardie maternelle. Il est exceptionnel de la voir persister à la naissance.
De même, les valeurs de la glycémie post-natale ne sont qu'exceptionnellement perturbées.
BETANYL®, utilisé dans le traitement de l'asthme et des autres pathologies pulmonaires, est un agent tocolytique et doit donc être utilisé avec prudence en fin de grossesse.
En cas d'administration avant accouchement tenir compte de l'effet vasodilatateur périphérique des bêta2 mimétiques.
Allaitement : Les bêta2 mimétiques passent dans le lait maternel.
DANS TOUS LES CAS CONSULTER VOTRE MEDECIN.

EFFETS INDÉSIRABLES :
La gravité des effets indésirables dépend du dosage et de la voie d'administration. La terbutaline prescrite en inhalation est peu probable de produire des effets systémiques significatifs en administration aux doses recommandées. La plupart de ces effets sont caractéristiques des amines sympathomimétiques. La majorité de ces effets ont été spontanément réversibles au cours des deux premières semaines de traitement.

Fréquence	Classe de système d'organe	Effets indésirables
Très fréquents (≥ 1/10)	Affections du système nerveux	Céphalées Tremblements des extrémités
Fréquents (< 1/10 et ≥ 1/100)	Affections cardiaques	Tachycardie Palpitations
	Affections musculo-squelettiques et systémiques	Crampes musculaires
	Troubles du métabolisme et de la nutrition	Hypokaliémie, augmentation de la glycémie
Rares (< 1/1000 et ≥ 1/10000)	Affections du métabolisme et de la nutrition	Acidose lactique
Indéterminée	Affections cardiaques	Troubles du rythme cardiaque, en particulier fibrillation auriculaire, tachycardie supraventriculaire et extrasystoles auriculaires ou ventriculaires, ischémie myocardique
	Affections gastro-intestinales	Nausées
	Affections psychiatriques	Troubles du sommeil et troubles du comportement : agitation, nervosité, hyperactivité
	Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales	Bronchospasme**, toux**
	Affections de la peau et tissu sous-cutané	Éruption cutanée érythémateuse, urticaire, exanthème

** Comme avec d'autres produits inhalés, possibilité de survenue de toux et rarement de bronchospasme paradoxal à la suite de l'inhalation du produit. Dans ce cas, il conviendra d'interrompre ce traitement et de prescrire d'autres thérapeutiques ou d'autre forme d'administration.
SIGNALER OBLIGATOIREMENT A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI N'EST PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.
SURDOSAGE :
En cas de surdosage : sont majorés le risque de tachycardie et arythmie cardiaque, modifications tensionnelles, tremblements, sueurs, agitation, nausées, hypokaliémie.
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :
Posologie :
- Adulte : 5 mg à 10 mg soit 1 à 2 doses de 2 ml par nébulisation.
- Enfant et nourrisson : 0,1 à 0,2 mg/kg par nébulisation.

Toute unidose entamée doit être utilisée dans les 24 heures.
La nébulisation peut être renouvelée toutes les 20 à 30 minutes en fonction du résultat clinique et de la tolérance du traitement.

Mode d'administration :
Cette solution de terbutaline doit être administrée par voie inhalée à l'aide d'un appareil pour nébulisation (nébuliseur).
Ne pas injecter. Ne pas avaler.
Se conformer au mode d'emploi de l'appareil utilisé. Diluer la quantité nécessaire de terbutaline dans du sérum physiologique de façon à obtenir un volume total de 4 à 5 ml. Le mélange obtenu est pulsé par un débit d'air ou d'oxygène (6 à 8 litres/minute) pendant environ 10 à 15 minutes durant les quelles le patient respire à son rythme habituel. La technique d'utilisation par le patient doit être vérifiée régulièrement. Après inhalation, la solution inutilisée restant dans la cuve de l'appareil doit être jetée.
SE CONFORMER OBLIGATOIREMENT AUX PRESTCRIPTIONS DE VOTRE MEDECIN.
PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :
- A conserver à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 25 °C.
- Après ouverture du sachet : les unidoses doivent être maintenues dans le sachet et utilisées dans les 3 mois.

TABLEAU A
Médicament autorisé N° : 9093731H



Retirer un récipient unidose de la plaquette

Ouvrir le récipient en tordant vigoureusement son extrémité supérieure

Presser le récipient pour le vider dans le réservoir du nébuliseur

CECI EST UN MÉDICAMENT
- Ceci est un produit qui affecte la santé et le non-respect du mode d'administration vous met en danger.
- Suivez attentivement la prescription du médecin, le mode d'emploi et les conseils du pharmacien.
- Le médecin et le pharmacien sont les experts du médicament et savent ses bénéfices et ses risques.
- N'arrêtez pas la prise du traitement de votre propre initiative.
- Ne renouvelez pas l'approvisionnement en ce médicament sans revenir au médecin.
- Ne laissez pas les médicaments à la portée des enfants.

CONSEIL DES MINISTRES ARABES DE LA SANTE

Titulaire/Exploitant/Fabricant
UNIMED
Z.I. Kalâa Kébira - BP : 38 - 4060 TUNISIE
Tél. : (+ 216) 70 029 501
Fax : (+216) 73 342 472
Site Web : www.unimed.com.tn

Edition : 03
Date : 11 / 2025
14BET101

Titre :	**Notice BETANYL® 2 ml B50**
Version :	03
Date de réalisation :	**29/11/2025**
Dimension	**150 x 270 mm**
Destination (Pays….) :	**TUNISIE**

بيتانيل®

سلفات التيربوتالين 5 مغ / 2 مل
محلول للإستنشاق عبر رذاذة

الشكل :
محلول للإستنشاق عبر رذاذة.
علبة تحتوي على 50 وحدة معقّمة ذات 2 مل في أكياس من الألومينيوم ذات 10 وحدات.

التركيبة :
سلفات التيربوتالين..... 250 مغ
سواغات : كلوريد الصّوديوم، إيديتات الصّوديوم، حامض الهيدروكلوريك، ماء منقى كاف لــ:.....100 مل

الصّنف العلاجي :
ناهضات انتقائيّة للأدرينيّات البيتا 2.
هذا الدواء هو محاكي البيتا 2 ذو فعاليّة سريعة و قصيرة المدى.
هذا الدواء هو موسع قصبي (يزيد في مقاس القصبات).

دواعي الإستعمال :
- علاج أعراضي للرّبو الحادّ الخطير.
- علاج الانتكاسات الحادة للإعتلال القصبي الرئوي المزمن المسد لدى البالغين.
بالاقتران مع علاج مستمر مضاد للالتهاب مثل القشرانيات المستنشقة أو مناهضات مستقبلات الليكوترين.
ملاحظة : يتطلب الربو الحاد الخطير الإيواء في المستشفى في وحدات العناية المركزة.
يجب أن تكون المعالجة الأكسيجينيّة والمعالجة القشرانيّة عبر السبيل الجهازي مقترنتين بالعلاج الموسّع القصبيّ.

موانع الإستعمال :
- عدم تحمّل هذا الدّواء (ظهور سعال أو تشنّج قصبي بعد إستنشاق الدّواء). في هذه الحالة، يجب إيقاف العلاج و وصف طرق علاجية أو أشكال أخرى لإعطاء الدواء.
- سوابق فرط الحساسيّة (أرجية) للتيربوتالين أو لأحد مكوّنات هذا الدّواء.

التحذيرات و إحتياطات الإستعمال :

التحذيرات :
يجب أن يقتصر التداوي بالتيربوتالين بواسطة رذاذة على الحالات الحادّة الخطيرة التي تستوجب استنشاق كمية كبيرة من الدّواء.
تتطلب هذه الحالات إشرافا طبيا مع إمكانية إجراء إنعاش (عبر السبيل الوريدي والمساعدة على التنفس)؛ بصفة عامة يجب الاستعمال المتزامن للمعالجة الأكسيجينيّة و المعالجة القشرانيّة عبر السبيل الجهازي.
من الضروري الجمع مع علاج مستمر مضاد للالتهاب مثل القشرانيات المستنشقة أو مناهضات مستقبلات الليكوترين لدى المرضى الذين يعانون من الربو المستمر والذين يتطلبون علاجا مستمرا بمحاكيات البيتا 2. يجب إعلام هؤلاء المرضى بالاستمرار في استعمال دوائهم المضاد للالتهاب بعد بدء استعمال بيتانيل® حتى عندما تتحسن أعراضهم. إذا استمرت الأعراض أو إذا كان العلاج بمحاكيات البيتا 2 بحاجة إلى زيادة في الجرعة، فهذا يشير إلى تفاقم ضمني للمرض و بالتالي يجب إعادة ملائمة العلاج.
يمكن ملاحظة تأثيرات قلبيّة وعائيّة مع الأدوية محاكية الودي، بما في ذلك بيتانيل® : حدوث حالات نادرة من إقفار عضلة القلب مرتبطة باستعمال محاكيات البيتا 2. يجب إعلام المرضى الذين عولجوا ببيتانيل® والذين يعانون من أمراض قلبية حادة (داء قلبي إقفاري، عدم انتظام ضربات القلب أو قصور قلبي حاد) بطلب المشورة الطبية إذا كانوا يعانون من ألم في الصدر أو أي عرض آخر يشير إلى تدهور مرض القلب. يجب إيلاء اهتمام خاص لأعراض مثل ضيق التنفس أو ألم الصدر لأن سببها قد يكون تنفسيا أو قلبيا.

إحتياطات الإستعمال :
في حالة الإصابة بعدوى القصبات الهوائيّة أو ثر قصبي غزير، من الضروري إستعمال علاج مناسب لتسهيل الإنتشار الأمثل للدّواء داخل السبل التنفّسيّة.
يجب إستعمال هذا الدّواء بحذر في حالة فرط نشاط الغدّة الدرقيّة، إعتلال قلبي وعائي خاصّة إعتلال عضلة القلب الإنسدادي، إضطرابات ناجيّة، اضطرابات النظم القلبي، إرتفاع ضغط الدم وفي حالة السكّري.
يمكن أن تسبب الجرعات العالية بمحاكيات البيتا 2 نقص بوتاسيوم الدم ما يمكن أن يعزز ظهور اضطرابات نظم القلب. يوصى بمراقبة بوتاسيوم الدم قدر الإمكان، لا سيما عند الاستعمال المتزامن لعلاجات أخرى مخفضة لبوتاسيوم الدم، في حالة نقص التأكسج أو لدى المرضى الذين لديهم خطر مرتفع لحدوث تموجات نقطية (فترة QT طويلة أو أدوية يمكن أن تطيل فترة QTc).
- يمكن لحاصرات البيتا (بما في ذلك قطرات العين) أن تثبط جزئيًا أو كليًا تأثير منبّهات البيتا 2.

الرياضيون
يحتوي هذا الدواء على مادة فعالة يمكن أن تؤدي إلى تفاعل إيجابي للاختبارات التي يتم إجراؤها أثناء مراقبة مكافحة المنشّطات.

التفاعلات الدوائية و تفاعلات أخرى :
<u>- استعمالات متزامنة غير منصوح بها :</u>
+ **هالوثان**
في حالة التوليد، إرتفاع العطالة الرحميّة مع خطر النزيف الداخلي، أيضا، خطر حدوث إضطرابات خطيرة للنظم البطيني بارتفاع التفاعل القلبيّ.
أوقف العلاج بمحاكيات البيتا 2 إذا كان التخدير سيتم بواسطة الهالوثان.
<u>- استعمالات متزامنة تستوجب إحتياطات الإستعمال :</u>
+ **الأدوية المضادة للسكري**
إرتفاع سكّر الدم نتيجة لأثر منبّهات البيتا.
يجب تقوية مراقبة الدم والبول. مع احتمال المرور إلى الأنسولين.
+ **عوامل مسببة لنقاد البوتاسيوم**
نظرا لتأثير نقص بوتاسيوم الدم لمحاكيات البيتا 2، فإن الاستعمال المتزامن للعوامل المسببة لنقاد البوتاسيوم و المعروفة بأنها تزيد من خطر نقص بوتاسيوم الدم، مثل مدرات البول، الديجوكسين، ميثيل الزانتين و الستيرويدات القشريّة يجب أن يكون بحذر بعد التقييم الدقيق للفوائد والمخاطر مع إيلاء اهتمام خاص لزيادة خطر اضطراب النظم الناتج عن نقص بوتاسيوم الدم. يؤهب نقص بوتاسيوم الدم للتسمّم بالديجوكسين.

الحمل و الإرضاع :
الحمل :
يمكن استعمال هذا الدواء أثناء الحمل في ظل الظروف العادية للاستعمال.
عند استعمال بيتانيل® ، كل يوم وليس فقط عند الضرورة، فإن الحذر واجب في نهاية الحمل لأنه يتسبب في ارتخاء الرحم.
<u>عند استعماله أثناء الحمل :</u>
يمكن ملاحظة تسرّع في النظم القلبي للجنين بالموازاة مع تسرّع القلب لدى الأم. قد يستمر بشكل استثنائي بعد الولادة.
بالمثل، قد يضطرب معدل سكر الدم بعد الولادة بشكل استثنائي.
بيتانيل® ، المستعمل لعلاج الربو وأمراض الرئة الأخرى، هو عامل حال للمخاض، إذا يجب استعماله بحذر في أواخر الحمل.
في حالة الاستعمال قبل الولادة يجب الأخذ بعين الاعتبار التأثير الموسع للأوعية المحيطي لمحاكيات البيتا 2.

الإرضاع
تمرّ محاكيات البيتا 2 عبر حليب الأم.
في كافة الحالات إستشيري طبيبك المباشر.

تأثيرات غير مرغوب فيها :
ترتبط شدة التأثيرات الغير مرغوب فيها بالجرعة و سبيل الاستعمال. من غير المحتمل أن ينتج عن التيربوتالين المستعمل عن طريق الاستنشاق تأثيرات جهازية كبيرة عند استعماله في حدود الجرعات الموصى بها. معظم هذه التأثيرات هي من خصائص الأمبنات محاكية الودّيّ. كانت غالبية هذه التأثيرات قابلة للانعكاس تلقائيا خلال الأسبوعين الأولين من العلاج.

نسبة التواتر	الجهاز	التأثير الغير مرغوب فيه
شائع جدا (≤ 1/10)	أمراض الجهاز العصبي	صداع في الرأس إرتعاشات في الأطراف
شائع (≤ 1/10 و ≥ 1/100)	أمراض القلب	تسارع دقات القلب خفقان
	أمراض عضلية هيكلية و جهازيّة	تشنجات العضلات
	إضطرابات الاستقلاب والتغذية	نقص بوتاسيوم الدم، ارتفاع سكر الدم
نادر (≤ 1/1000 و ≥ 1/10000)	أمراض الاستقلاب والتغذية	الحماض اللبني
غير معروف	أمراض القلب	اضطرابات النظم القلبي، لا سيما رجفان أذيني، تسرّع القلب فوق البطيني و انقباضات خارجية أذينية أو بطينية، إقفار عضلة القلب
	أمراض الجهاز الهضمي	غثيان
	أمراض نفسية	اضطرابات النوم والسلوك : هياج، عصبية، فرط النشاط
	أمراض تنفسية، صدريّة ومنصفيّة	تشنج قصبي **، سعال **
	أمراض الجلد والنسيج تحت الجلد	طفح جلدي حمامي، شرى، طفح ظاهر

** كما هو الحال مع الأدوية المستنشقة الأخرى، احتمالية حدوث سعال ونادرا ما يحدث تشنج قصبي تناقضي بعد استنشاق الدواء. في هذه الحالة، يجب إيقاف هذا العلاج ووصف طرق علاجية أو أشكال دوائية أخرى.

يجب إعلام الطبيب أو الصيدلاني في حالة ظهور أي تأثير آخر غير مرغوب فيه و مقلق غير مذكور في هذه النشرة.

تجاوز الجرعة :
في حالة تجاوز الجرعة: ارتفاع خطر تسرّع القلب و إضطراب النظم، تغيّرات في ضغط الدم، إرتعاش، عرق، هياج، غثيان، نقص بوتاسيوم الدم.

المقادير و طريقة الاستعمال :
المقادير :
- <u>الكهول :</u> 5 مغ إلى 10 مغ أي من جرعة إلى جرعتين ذات 2 مل للإرذاذ الواحد.
- <u>الأطفال و الرضع :</u> 0،1 إلى 0،2 مغ/ كغ للإرذاذ الواحد.

يجب استعمال كل وحدة مفتوحة خلال 24 ساعة.
يمكن تجديد الإرذاذ كل 20 إلى 30 دقيقة تبعا للنتيجة السريريّة و مدى تحمّل العلاج.

طريقة الاستعمال :
- يجب إستعمال التيربوتالين عبر الإستنشاق بواسطة آلة للإرذاذ (رذاذة).
- لا تحقن هذا الدّواء. لا تتجرّعه.
- تقيّد بطريقة إستعمال الآلة المستخدمة. خفّف من كمّيّة التيربوتالين الضروريّة باستعمال المصل الفيزيولوجي للحصول على حجم كلي مساو ل 4 أو 5 مل. يدفع الخليط المتحصّل عليه عن طريق تدفّق الهواء أو الأكسجين (من 6 إلى 8 لتر / دقيقة) لمدّة حوالي 10 إلى 15 دقيقة يستنشق خلالها المريض بنظمه العادي. يجب مراقبة تقنية استعمال المريض بصفة منتظمة. بعد إستنشاق الدّواء، يجب إلقاء المحلول الدّوائي المتبقي الغير مستعمل داخل خزّان الجهاز.

يجب الإلتزام بتعليمات الطبيب بدقّة.

الحفظ :
- يحفظ بعيدا عن الضّوء و في درجة حراريّة أقلّ من 25 درجة مائويّة.
- بعد فتح الكيس : يجب حفظ الوحدات القياسية داخل الكيس و إستعمالها خلال 3 أشهر.

جدول أ
التأشيرة : 9093731H



اسحب وحدة من الرقاقة

افتح الوحدة بلوي طرفها العلوي بقوّة

اضغط على الوحدة لإفراغها داخل خزّان الرّذاذة

إن هذا دواء

- هذا مستحضر يؤثر على صحتك و استعماله خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلاني الذي صرفه لك.
- الطبيب و الصيدلاني هما الخبيران بالدواء و بنفعه و ضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

صاحب التسجيل/المشغّل/المصنّع
يونيماد
المنطقة الصناعية القلعة الكبرى
ص.ب : 38 - 4060 تونس
الهاتف : 501 029 70 (216+)
الفاكس : 472 342 73 (216+)
موقع الواب : www.unimed.com.tn

نشرة : 03
تاريخ : 11 / 2025

14BET101

Titre :	**Notice BETANYL® 2 ml B50**
Version :	03
Date de réalisation :	**29/11/2025**
Dimension	**150 x 270 mm**
Destination (Pays….) :	**TUNISIE**