VAAMOX®

Amoxicilline / Acide clavulanique
Poudre pour préparation injectable I.V.

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais pas à d'autres personnes. Il pourrait lui être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que VAAMOX® et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VAAMOX® ?
3. Comment utiliser VAAMOX®?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VAAMOX®?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que VAAMOX® et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VAAMOX® ?
3. Comment utiliser VAAMOX®?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VAAMOX®?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE VAAMOX® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmaco thérapeutique : Association de pénicillines, y compris inhibiteurs de la bêta-lactamase. - code ATC : J01CR02

VAAMOX® est indiqué pour le traitement des infections suivantes chez l'adulte et l'enfant :
- infections sévères O.R.L (telles que mastoïdite, infections péri-amygdaliennes, épiglottite et sinusite, lorsqu'elles sont accompagnées de signes et symptômes systémiques sévères),
- exacerbation de bronchite chronique (diagnostiquée de façon appropriée),
- pneumonie aiguë communautaire,
- cystite,
- pyélonéphrite,
- infections de la peau et des tissus mous, en particulier cellulite, morsures animales, abcès dentaire sévère avec propagation de cellulite,
- infections des os et des articulations, en particulier ostéomyélite,
- infections intra-abdominales,
- infections génitales de la femme.

Prophylaxie des infections post-opératoires chez l'adulte impliquant :
- l'appareil digestif, la cavité pelvienne, la tête et le cou et le système biliaire.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER VAAMOX® ?

N'utilisez jamais VAAMOX® en cas de :
- Hypersensibilité aux substances actives, aux pénicillines ou à l'un des excipients.
- Antécédents de réaction d'hypersensibilité immédiate sévère (par ex., anaphylaxie) à une autre bêta-lactamine (par ex., une céphalosporine, un carbapénème ou un monobactame).
- Antécédents d'ictère/atteinte hépatique liés à l'association amoxicilline/acide clavulanique (voir rubrique Effets indésirables).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant d'utiliser VAAMOX® si vous : souffrez de mononucléose infectieuse, vous êtes traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins et vous n'urinez pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère avant d'utiliser VAAMOX®.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactérie responsable de l'infection.

Selon les résultats, il pourra vous prescrire un dosage différent de VAAMOX® ou un autre médicament.

Réactions nécessitant une attention particulière

VAAMOX® peut aggraver certaines maladies ou engendrer des effets secondaires graves, notamment des réactions allergiques, des convulsions et une inflammation du gros intestin. Lorsque vous utilisez VAAMOX® vous devez surveiller certains symptômes afin de réduire les risques. Voir « Effets indésirables ».

Tests sanguins et urinaires

Si vous effectuez des analyses de sang (nombre de globules rouges ou explorations fonctionnelles du foie) ou des analyses d'urine (dosage du glucose), vous devez informer le médecin ou l'infirmier/ère que vous prenez VAAMOX®.

En effet, VAAMOX® peut modifier les résultats de ces types de tests.

Enfants: sans objet.

Autres médicaments et VAAMOX®

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Cela inclut les médicaments vendus sans ordonnance, et aussi les produits à base de plantes.

Si vous prenez de l'allopurinol (en traitement de la goutte) avec VAAMOX®, le risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.

Probénécide (utilisé dans le traitement de la goutte), l'utilisation concomitante de probénécide peut réduire l'excrétion de l'amoxicilline et n'est pas recommandée.

Si des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine) sont pris avec VAAMOX®, des analyses sanguines supplémentaires peuvent être requises.

VAAMOX®, peut influer sur l'action du méthotrexate (un médicament utilisé pour traiter le cancer ou les maladies rhumatismales). Méthotrexate (utilisé dans le traitement de cancer et du psoriasis sévère), les pénicillines peuvent réduire l'excrétion du méthotrexate entrainant une possible augmentation des effets indésirables.

VAAMOX®, peut influer sur l'action du mycophénolate mofétil (traitement pour prévenir le rejet de greffe d'organes).

VAAMOX® avec des aliments, des boissons et de l'alcool: Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

VAAMOX® peut provoquer des effets indésirables susceptibles de réduire la capacité à conduire.

Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines si vous ne vous sentez pas bien.
- **VAAMOX® 500mg / 50mg Enfant et Nourrisson** contient 31,45 mg de sodium (composant principal du sel de cuisine/table). Cela équivaut à 1,57 % de l'apport alimentaire quotidien maximal recommandé de sodium pour un adulte. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium et contient 9,8 mg de potassium moins de 1 mmol (39,3 mg) de potassium par flacon, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans potassium ».
- **VAAMOX® 1g / 100mg Enfant** contient 62,90 mg de sodium (composant principal du sel de cuisine/table). Cela équivaut à 3,14 % de l'apport alimentaire quotidien maximal recommandé de sodium pour un adulte. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.et contient 19,6 mg de potassium moins de 1 mmol (39,3 mg) de potassium par flacon, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans potassium ».
- **VAAMOX® 1g / 200mg adulte** contient 62,90 mg de sodium (composant principal du sel de cuisine/table). Cela équivaut à 3,14 % de l'apport alimentaire quotidien maximal recommandé de sodium pour un adulte. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium et contient 39,3 mg de potassium égale à 1 mmol (39,3 mg) de potassium par flacon. À prendre en compte chez les patients insuffisants rénaux ou chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en potassium.
- **VAAMOX® 2g / 200mg adulte** contient 125,9 mg de sodium (composant principal du sel de cuisine/table). Cela équivaut à 6,29 % de l'apport alimentaire quotidien maximal recommandé de sodium pour un adulte. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium et contient 39,3 mg de potassium égale à 1 mmol (39,3 mg) de potassium par flacon. À prendre en compte chez les patients insuffisants rénaux ou chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en potassium.

3. COMMENT UTILISER VAAMOX® ?

Vous ne vous administrerez jamais vous-même ce médicament. Il vous sera administré par une personne qualifiée, comme un médecin ou un(e) infirmier (ière).

Posologie :

Les doses habituelles sont :
- **Adultes et enfants de 40 kg et plus**

	VAAMOX® 1g/200mg	VAAMOX® 1g/100mg, VAAMOX® 2g/200mg, VAAMOX® 500mg/50mg
Dose habituelle	1g/200 mg toutes les 8 heures	1 g/100 mg toutes les 8 à 12 heures.
Dose supérieure		1 g/100 mg toutes les 8 heures ou 2 g/200 mg toutes les 12 heures En cas d'infection très grave, la dose peut être augmentée jusqu'à un maximum de 2g/200 mg administré toutes les 8 heures.
Pour arrêter les infections pendant et après une intervention chirurgicale	1g/200 mg avant l'intervention lors de l'administration de l'anesthésie. La dose peut varier en fonction du type d'intervention. Votre médecin peut répéter l'administration si l'intervention dure plus d'1 heure.	1 g/100 mg à 2 g/200 mg avant l'intervention lors de l'administration de l'anesthésie. La dose peut varier en fonction du type d'intervention. Votre médecin peut répéter l'administration si l'intervention dure plus d'1 heure.

- **Enfants pesant moins de 40 kg**

Toutes les doses sont établies en fonction du poids de l'enfant en kilogrammes.

	VAAMOX® 1g/200mg	VAAMOX® 1g/100mg, VAAMOX® 2g/200mg, VAAMOX® 500mg/50mg
Enfants de 3 mois et plus	25 mg/5 mg par kilogramme de poids corporel toutes les 8 heures	50 mg/5 mg par kilogramme de poids corporel toutes les 8 heures.
Enfants âgés de moins de 3 mois ou pesant moins de 4 kg	25 mg/5 mg par kilogramme de poids corporel toutes les 12 heures	50 mg/5 mg par kilogramme de poids corporel toutes les 12 heures.

- **Patients souffrant de problèmes rénaux et hépatiques :**
- En cas de problèmes rénaux, il est possible qu'une dose différente vous soit administrée. Le médecin pourra prescrire un dosage différent ou un autre médicament.
- En cas de problèmes au foie, votre médecin vous surveillera étroitement et les examens de votre foie seront plus réguliers.

Mode d'administration :
- VAAMOX® est destiné à une administration intraveineuse.
- VAAMOX® peut être administré soit par injection intraveineuse lente sur une période de 3 à 4 minutes directement dans une veine ou en perfusion de 30 à 40 minutes.
- Chez l'enfant de moins de 3 mois, VAAMOX® doit être administré en perfusion uniquement.
- Le traitement par VAAMOX® peut être débuté par une formulation intraveineuse et complété par une formulation orale appropriée, selon le patient.
- VAAMOX® n'est pas adapté à une administration intra-musculaire.

Reconstitution :

Préparation des solutions pour injection intraveineuse

L'eau pour préparations injectables est le solvant à utiliser. VAAMOX® doit être dissous dans 20 ml de solvant, ce qui conduit à la préparation d'environ 20,9 ml de solution pour administration en dose unique. Une coloration rose transitoire peut se développer ou non pendant la reconstitution. Les solutions reconstituées sont normalement incolores ou jaune paille clair.

Préparation des solutions pour perfusion intraveineuse

VAAMOX® doit être reconstitué comme décrit ci-dessus pour l'injection. La solution reconstituée doit être ajoutée immédiatement à 50 ml de liquide de perfusion en utilisant une petite poche ou un perfuseur à burette.

Les flacons de VAAMOX® ne sont pas adaptés à une administration multidose.

La poudre doit être remise en solution dans de l'eau pour préparations injectables ou une solution injectable de chlorure de sodium à 0,9%.

Pour l'administration en perfusion, il est également possible d'utiliser une solution injectable de Ringer ou de Hartmann.

Si vous avez pris plus de VAAMOX® que vous n'auriez dû

L'administration d'une quantité excessive de VAAMOX® est peu probable, mais si vous pensez en avoir reçu plus que vous n'auriez dû, contactez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière (ier). Les signes possibles sont des maux de ventre (nausées, vomissements ou diarrhée) ou des convulsions.

Si vous oubliez d'utiliser VAAMOX®

N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d'utiliser.

Si vous arrêtez d'utiliser VAAMOX® : Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Ce médicament peut entraîner les effets indésirables mentionnés ci-dessous.

Réactions nécessitant une attention particulière

Réactions allergiques :
- éruption cutanée
- Inflammation des vaisseaux sanguins (vascularite) pouvant apparaître sous forme de taches rouges ou violettes sur la peau, mais pouvant également toucher d'autres parties du corps,
- Fièvre, douleurs articulaires, ganglions dans le cou, l'aisselle et l'aine,
- Gonflement, parfois du visage ou au niveau de la gorge (angio-œdème), entraînant des difficultés respiratoires.
- Malaise brutal avec chute de la pression artérielle.
- douleurs thoraciques dans un contexte de réactions allergiques, qui peuvent être le symptôme d'un infarctus du myocarde déclenché par une allergie (syndrome de Kounis).

➢ Si vous présentez un de ces symptômes, **contactez un médecin immédiatement. Arrêtez l'administration de VAAMOX®.**

Inflammation du gros intestin :

Inflammation du gros intestin, entraînant une diarrhée aqueuse avec du sang et du mucus, des douleurs gastriques et/ou fièvre.

Inflammation aiguë du pancréas (pancréatite aiguë) :

Si vous ressentez une douleur intense et continue au niveau de l'estomac, cela peut être un signe de pancréatite aiguë.

Syndrome d'entérocolite induite par les médicaments (SEIM) :

Le SEIM a été rapporté principalement chez des enfants recevant de l'amoxicilline/acide clavulanique. Il s'agit d'un certain type de réaction allergique avec comme principal symptôme des vomissements répétés (1 à 4 heures après l'administration du médicament). Les autres symptômes peuvent inclure des douleurs abdominales, une léthargie, des diarrhées et une tension artérielle basse.

➢ Si vous présentez ces symptômes, **demandez conseil le plus tôt possible à votre médecin.**

Effets indésirables fréquents : (Ils peuvent affecter moins de 1 personne sur 10) :

Muguet (affection due à un champignon, le candida, que se développe dans le vagin, la bouche ou les plis cutanés), Diarrhée.

Effets indésirables peu fréquents : (Ils peuvent affecter moins de 1 personne sur 100) :
- Eruption cutanée, démangeaisons,
- Eruption cutanée en saillie avec démangeaisons (urticaire),
- Nausées, en particulier à doses élevées.

➢ Si vous ou votre enfant présentez ces effets indésirables, **administrez VAAMOX® avant les repas.**
- Vomissements, indigestion, étourdissements et maux de tête.

Effets indésirables peu fréquentes pouvant être mis en évidence par les analyses de sang :

Augmentation de certaines substances (enzymes) produites par le foie.

Effets indésirables rares : (Ils peuvent affecter moins de 1 personne sur 1000) :
- Eruption cutanée, pouvant former des cloques et ressemblant à petites taches (points noirs centraux entourés d'une zone plus pâle, avec un anneau sombre tout autour : érythème polymorphe).

➢ Si vous remarquez un de ces symptômes, **contactez un médecin en urgence.**
- Gonflement et rougeur le long d'une veine, extrêmement sensible au toucher.

Effets indésirables rares pouvant être mis en évidence par les analyses de sang :
- Faible nombre de cellules participant à la coagulation sanguine (plaquettes),
- Faible nombre de globules blancs.

Fréquence indéterminée : (La fréquence ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :
- Réactions allergiques (voir ci-dessus),
- Inflammation du gros intestin (voir ci-dessus),
- Inflammation de la membrane protectrice entourant le cerveau (méningite aseptique),
- cristaux dans les urines entraînant des lésions rénales aiguës
- Réactions cutanées graves :
- Eruption étendue avec cloques et desquamation de la peau, en particulier autour de la bouche, du nez, des yeux et dans la région génitale (syndrome de Stevens-Johnson), et une forme plus grave, responsable d'un décollement cutané important (plus de 30% de la surface corporelle : syndrome de Lyell),
- Eruption cutanée rouge étendue avec petites cloques contenant du pus (dermatite bulleuse ou exfoliatrice),
- Eruption squameuse rouge avec masses sous la peau et des cloques (pustulose exanthématique).
- éruption cutanée avec des cloques disposées en cercle et des croûtes au niveau du centre ou ayant un aspect de collier de perles (dermatose à IgA linéaire).
- symptômes de type grippal accompagnés d'une éruption cutanée, de fièvre, de ganglions enflés, et de résultats anormaux des tests sanguins [dont une augmentation des globules blancs (éosinophilie) et des enzymes hépatiques] [syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse (DRESS)].

➢ **Si vous présentez l'un de ces symptômes, contactez un médecin immédiatement.**
- Inflammation du foie (hépatite),
- Inflammation des membranes enveloppant le cerveau et la moelle épinière (méningite aseptique) ;
- Ictère, provoqué par une augmentation du taux sanguin de bilirubine (une substance produite dans le foie), qui donne une coloration jaune à la peau et au blanc des yeux,
- Inflammation des reins,
- Prolongation du temps de coagulation du sang,
- Convulsions (chez les personnes prenant des doses élevées de VAAMOX® ou ayant des problèmes rénaux).

Effets indésirables pouvant être mis en évidence par les analyses de sang ou d'urine :
- Réduction importante du nombre de globules blancs,
- Faible nombre de globules rouges (anémie hémolytique).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : https://vigiflow-eforms.who-umc.org/tn/cnpv

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER VAAMOX® ?

Tenir ce médicament hors de la vue et la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.
- **Avant reconstitution :** Conserver les flacons de poudre de VAAMOX® à une température inférieure à 25° C.
- **Après reconstitution :** une utilisation immédiate est recommandée.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS.

Ce que contient VAAMOX® :
- **VAAMOX® 500mg / 50mg Enfant et Nourrisson :**

Les substances actives sont :
Amoxicilline (sous forme d'amoxicilline sodique)……..500 mg
Acide clavulanique (sous forme de clavulanate de potassium) .....50 mg
Les autres composants : Sans objet.
- **VAAMOX® 1 g / 100 mg Enfant :**

Les substances actives sont :
Amoxicilline (sous forme d'amoxicilline sodique)……1 g
Acide clavulanique (sous forme de clavulanate de potassium) .....100 mg
Les autres composants : Sans objet.
- **VAAMOX® 1 g / 200 mg Adulte :**

Les substances actives sont :
Amoxicilline (sous forme d'amoxicilline sodique)…… 1 g
Acide clavulanique (sous forme de clavulanate de potassium) .....200 mg
Les autres composants : Sans objet.
- **VAAMOX® 2 g / 200 mg Adulte :**

Les substances actives sont :
Amoxicilline (sous forme d'amoxicilline sodique)…… 2 g
Acide clavulanique (sous forme de clavulanate de potassium) .....200 mg
Les autres composants : Sans objet.

Qu'est-ce que VAAMOX® et contenu de l'emballage extérieur
- VAAMOX® 500mg/ 50mg Enfant et nourrisson, poudre pour préparation injectable IV, boîte de 1 flacon (Médicament autorisé N° : 9093381) et boîte de 10 flacons (Médicament autorisé N° : 9093382).
- VAAMOX® 1g / 100mg Enfant, poudre pour préparation injectable IV, boîte de 1 flacon (Médicament autorisé N° : 9093387) et boîte de 10 flacons (Médicament autorisé N° : 9093388).
- VAAMOX® 1g / 200mg Adulte, poudre pour préparation injectable IV, boîte de 1 flacon (Médicament autorisé N° : 9093385) et boîte de 10 flacons (Médicament autorisé N° : 9093386).
- VAAMOX® 2g / 200mg Adulte, poudre pour préparation injectable IV, boîte de 10 flacons (Médicament autorisé N° : 9093389).

Tableau A

Titulaire et Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché et Fabricant

UNIMED
Z.I. Kalâa Kébira
BP : 38 - 4060 TUNISIE

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

Décembre 2025

Conseil d'éducation sanitaire :

QUE SAVOIR SUR LES ANTIBIOTIQUES ?

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.

Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs.

La résistance s'accroit par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas :

□ la dose à prendre,
□ les moments de prise,
□ et la durée de traitement.

En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :

1- N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.
2- Respectez strictement votre ordonnance.
3- Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.
4- Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.
5- Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.

Ceci est un médicament
- Un médicament est un produit mais pas comme les autres,
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger,
- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit,
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament et ses contre-indications,
- N'arrêtez pas et n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin,
- Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.

14VAM101

Titre :	**Notice VAAMOX**
Version :	**07**
Couleur	**Noir - P Reflex blue C équivalent RVB : 0 – 76 -153**
Date de réalisation :	01/12/2025
Dimension	**345 x 190 mm**
Destination (Pays.) :	**TUNISIE**

فامكس®

أموكسيسيلين / حامض الكلافيلانيك
مسحوق لمستحضر للحقن داخل الوريد

يرجى قراءة هذه النشرة بعناية قبل استعمال هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك
- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى، فاسأل طبيبك أو الصيدلاني أو الممرض/ة.
- لقد تم وصف هذا الدواء لك شخصيا، فلا تعطه أبدا لأشخاص آخرين، حتى لو كانت أعراض مرضهم مماثلة لأعراضك، فقد يسبب لهم الضرر.
- إذا شعرت بأي تأثير جانبي، أخبر طبيبك أو الصيدلاني أو الممرض/ة. ينطبق ذلك أيضا على أي تأثير جانبي غير مذكور في هذه النشرة. راجع القسم 4.
- احتفظ بهذا الدواء بعيدا عن متناول الأطفال.

ماذا تحتوي هذه النشرة ؟

1. ما هو فامكس® و ماهي دواعي استعماله ؟
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل استعمال فامكس®؟
3. كيفية استعمال فامكس®
4. ما هي الآثار غير المرغوب فيها المحتملة؟
5. كيفية حفظ فامكس®
6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى .

1. ما هو فامكس® و ماهي دواعي استعماله ؟

الفئة الدوائية العلاجية : مزيج البنيسيلين، بما في ذلك مثبطات البيتاكتماز- رمزATC : J01CR02

يتم استخدام فامكس® لعلاج الإصابات التالية عند البالغين والأطفال :
- الالتهاب الحاد للأذن و الألف والحنجرة (مثل التهاب الحنجرة و التهاب محيط اللوزة، التهاب لسان المزمار والتهاب الجيوب الأنفية، عندما تكون مصحوبة بعلامات وأعراض جسمية شديدة)،
- تفاقم التهاب الشعب الهوائية المزمن (بعدما تم تشخيصه بشكل مناسب)،
- الالتهاب الرئوي النظامي الحاد
- التهاب المثانة.
- التهاب الكلية و الحويضة
- التهاب الجلد والأنسجة الرخوة، وخاصة التهاب الهلل، اللدغات الحيوانية، خراج الأسنان الحاد مع انتشار الهلل.
- التهابات العظام والمفاصل، وخاصة التهاب العظم والنقي،
- التهابات داخل البطن).
- الالتهابات التناسلية لدى النساء.

الوقاية من العدوى بعد العمليات الجراحية عند البالغين والتي تشمل :
- الجهاز الهضمي، جوف الحوض، الرأس والرقبة و الجهاز الصفراوي.

يجب الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الرسمية المتعلقة بالاستعمال الصحيح لمضادات الجراثيم.

2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل إستعمال فامكس® ؟

لا يجب إستعمال فامكس® في الحالات التالية :
- فرط الحساسية للمواد الفعالة، البنسلين أو لأحد السواغات.
- سوابق ردود فعل فورية شديدة (على سبيل المثال، تأق) تجاه بيتا لاكتام آخر (على سبيل المثال، السيفالوسبورين، كاربابينيم أو أحادي الحلقة البيتالاكتامية).
- سوابق اليرقان / تضرر الكبد المرتبط بالجمع بين الأموكسيسيلين / حامض الكلافيلانيك).

التحذيرات واحتياطات الاستعمال :

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني أو الممرضة قبل استخدام فامكس® إذا كنت : تعاني من كريات الدم البيضاء المعدية، إذا كنت تتلقى علاجا للكبد أو الكلى أو إذا كنت لا تستطيع التبول بانتظام.

في حالة شك، استشر طبيبك أو الصيدلاني أو الممرضة قبل استخدام فامكس® .

في بعض الحالات، قد يبحث الطبيب عن نوع البكتيريا المسببة للعدوى.

اعتمادا على تلك النتائج، قد يصف لك جرعة مختلفة من فامكس® أو دواء آخر .

ردود فعل تتطلب انتباها خاصا

قد يؤدي فامكس® إلى تفاقم حالات معينة أو التسبب في آثار جانبية خطيرة، بما في ذلك ردود الفعل الأرجية والنوبات والتهاب الأمعاء الغليظة. عند استعمال فامكس® يجب عليك مراقبة بعض الأعراض للحد من الخطر. انظر " تأثيرات غير مرغوب فيها "

فحوصات الدم و البول :

يجب أن تخبر الطبيب أو الممرضة بأنك تأخذ فامكس® إذا كنت تجري فحوصات دم (تعداد خلايا الدم الحمراء أو فحوصات وظائف الكبد) أو فحوصات البول (اختبار الجلوكوز)، إذ يمكن لفامكس® تغيير نتائج هذه الأنواع من الفحوصات.

الأطفال : لا شيء.

أدوية أخرى و فامكس® مسحوق لمستحضر للحقن

أخبر طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرا أو قد تتناول أي أدوية أخرى. ويشمل ذلك الأدوية التي تباع دون وصفة طبية، وكذلك المنتجات العشبية.

إذا كنت تتناول ألوبيورينول (لعلاج النقرس) مع فامكس®، فإن خطر الإصابة برد فعل تحسسي جلدي يكون أعلى البروبينيد (المستخدم في علاج النقرس)، الاستخدام المتزامن للبروبينيد يمكن أن يقلل من إفراز الأموكسيسيلين ولا ينصح به.

إذا تم تناول أدوية مخصصة لمنع تخثر الدم (مثل الوارفارين) مع فامكس®، فقد تكون هناك حاجة إلى إجراء تحاليل دم إضافية.

قد يؤثر فامكس® على عمل الميثوتريكسات (دواء يستخدم لعلاج السرطان أو الأمراض الروماتيزمية) الميثوتريكسات (المستخدم في علاج السرطان والصدفية الحادة)، يمكن أن تقلل البنسلينات من إفراز الميثوتريكسات مما يؤدي إلى زيادة محتملة في الآثار الغير مرغوب فيها

قد يؤثر فامكس® على عمل الميكوفينولات موفيتيل (علاج لمنع رفض زرع الأعضاء).

فامكس®، مع الأطعمة والمشروبات والكحول : لا شيء.

الحمل و الارضاع :

إذا كنت حاملا أو ترضعين طبيعيا، أو إن ظننت أنك حامل أو تخططين لإنجاب طفل، اسألي طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول هذا الدواء.

السياقة و إستعمال الآلات :

قد يسبب فامكس® آثارا غير مرغوب فيها قد تضعف من قدرتك على القيادة. لا تقد السيارة و لا تستخدم الآلات إذا لم تشعر أنك على ما يرام.

- يحتوي **فامكس® 500 مغ/50 مغ للأطفال والرضع** حتى 31.45 مغ من الصوديوم (المكوّن الرئيسي لملح الطعام/المائدة) وهذا يعادل 1.57% من الحد الأقصى الموصى به من الصوديوم في النظام الغذائي اليومي للبالغين. يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند المرضى الذين يتحكمون في كمية الصوديوم في نظامهم الغذائي، ويحتوي على 9.8 مغ من البوتاسيوم أقل من 1 ميلي مول (39.3 مغ) من البوتاسيوم لكل قارورة، أي أنه" خالٍ من البوتاسيوم" بشكل أساسي.
- يحتوي **فامكس® 1 غ /100 مغ للأطفال** على 62.90 مغ من الصوديوم (المكون الرئيسي لملح الطعام/المائدة). وهذا يعادل 3.14% من الحد الأقصى الموصى به من الصوديوم في النظام الغذائي اليومي للبالغين. يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند المرضى الذين يتحكمون في تناولهم للصوديوم في نظامهم الغذائي. ويحتوي على 39.3 مغ من البوتاسيوم تعادل 1 ميلي مول (39.3 مغ) من البوتاسيوم لكل قارورة. يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند المرضى الذين يعانون من قصور كلوي أو المرضى الذين يتحكمون في استهلاكهم الغذائي من البوتاسيوم
- يحتوي **فامكس® 2 غ / 200 مغ للبالغين** على 125.9 مغ من الصوديوم (المكون الرئيسي لملح الطعام/المائدة). وهذا يعادل 6.29% من الحد الأقصى الموصى به من الصوديوم في النظام الغذائي اليومي للبالغين. يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند المرضى الذين يتحكمون في تناولهم للصوديوم في نظامهم الغذائي. ويحتوي على 39.3 مغ من البوتاسيوم، أي ما يعادل 1 ميلي مول (39.3 مغ) من البوتاسيوم لكل قارورة. يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند المرضى الذين يعانون من قصور كلوي أو المرضى الذين يتحكمون في استهلاكهم الغذائي من البوتاسيوم.

3. كيفية استعمال فامكس®

لن تقوم أبدا بإعطاء هذا الدواء لنفسك. سيتم إعطاؤه لك من قبل شخص مؤهل، مثل طبيب أو ممرض(ة).

المقادير :

المقادير العادية :

- **البالغين و الأطفال الذين وزنهم 40 كغ فما فوق :**

	فامكس® 1 غ/ 200 مغ	فامكس® 1 غ/ 100 مغ، فامكس® 2 غ/ 200 مغ، فامكس® 500 مغ/ 50 مغ
الجرعة العادية	1 غ/ 200 مغ كل 8 ساعات	1 غ/ 100 مغ كل 8 ساعات إلى 12 ساعة
الجرعة القصوى		1 غ/ 100 مغ كل 8 ساعات أو 2 غ/ 200 مغ كل 12 ساعة في حالة العدوى الشديدة الخطورة قد ترتفع الجرعة إلى حدود 2 غ/ 200 مغ كحد أقصى كل 8 ساعات.
لعلاج العدوى خلال و بعد التدخل الجراحي.	1 غ/ 200 مغ قبل التدخل الجراحي عند إعطاء مخدر. قد تختلف الجرعة تبعا لنوع التدخل. قد يكرر طبيبك الإستعمال إذا إستمر التدخل أكثر من ساعة واحدة.	1 غ/ 100 مغ الجرعة إلى 2 غ/ 200 مغ قبل التدخل الجراحي عند التخدير. قد تختلف الجرعة تبعا لنوع التدخل. قد يكرر طبيبك الإستعمال إذا إستمر التدخل أكثر من ساعة واحدة.

- **الأطفال الذين وزنهم أقل من 40 كغ :**

تعتمد الجرعات على وزن الطفل بالكغ

	فامكس® 1 غ/ 200 مغ	فامكس® 1 غ/ 100 مغ، فامكس® 2 غ/ 200 مغ، فامكس® 500 مغ/ 50 مغ
الأطفال الذين أعمارهم 3 أشهر أو أكثر	25مغ / 5مغ / كغ من كتلة الجسم كل 8 ساعات	50مغ / 5مغ / كغ من كتلة الجسم كل 8 ساعات
الأطفال الذين أعمارهم 3 أشهر أو وزنهم أقل من 4 كغ	25مغ / 5مغ / كغ من كتلة الجسم كل 12 ساعة	50مغ / 5مغ / كغ من كتلة الجسم كل 12 ساعة

- **المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى و الكبد :**
  - في حال وجود مشاكل في الكلى، من الممكن إعطاءك جرعة مختلفة. قد يصف لك الطبيب جرعة مختلفة أو دواء آخر.
  - في حال حدوث مشاكل في الكبد، سيراقبك طبيبك عن كثب وستكون فحوصات الكبد أكثر انتظاما.

طريقة الاستعمال :
- فامكس® مخصص للإعطاء عن طريق الوريد.
- يمكن إعطاء فامكس® إما عن طريق الحقن الوريدي البطيء على مدى 3 إلى 4 دقائق مباشرة في الوريد أو عن طريق التسريب لمدة 30 إلى 40 دقيقة
- بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر يجب إعطاء فامكس® عن طريق التسريب فقط.
- يمكن بدء العلاج بـ فامكس® بتركيبة وريدية واستكماله بتركيبة فموية مناسبة، حسب حالة المريض.
- فامكس® غير مناسب للإعطاء العضلي.

إعادة التكوين :

تحضير المحاليل للحقن الوريدي

يجب استخدام ماء التحضيرات القابلة للحقن كمذيب. يجب إذابة فامكس® في 20 مل من المذيب، مما يؤدي إلى تحضير حوالي 20.9 مل من المحلول لإعطائه في جرعة واحدة. قد يظهر لون وردي مؤقت أثناء إعادة التكوين أو قد لا يظهر. عادة ما تكون المحاليل المعاد تكوينها عديمة اللون أو صفراء فاتحة

تحضير المحاليل للارواء الوريدي

يجب إعادة تكوين فامكس® كما هو موضح أعلاه للحقن. يجب إضافة المحلول المعاد تكوينه على الفور إلى 50 مل من سائل الارواء باستخدام كيس صغير أو محقن بوريت.

زجاجات فامكس® غير مناسبة للإعطاء متعدد الجرعات.

يجب إعادة إذابة المسحوق في ماء للتحضيرات القابلة للحقن أو محلول كلوريد الصوديوم القابل للحقن بنسبة 0.9 % للإعطاء عن طريق التسريب، يمكن أيضا استخدام محلول رينجر أو هارتمان القابل للحقن.

إذا استخدمت كمية من فامكس® أكثر مما ينبغي

من غير المرجح أن يتم إعطاء جرعة زائدة من فامكس® ولكن إذا كنت تعتقد أنك تلقيت جرعة أكثر مما ينبغي، فاتصل على الفور بطبيبك أو الصيدلاني أو الممرض/الممرضة.

قد تظهر أعراض مثل الام في البطن (غثيان، قيء أو إسهال) أو تشنجات.

إذا نسيت استخدام فامكس®

لا تستخدم جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيت استخدامها.

إذا توقفت عن استخدام فامكس® : لا شيء.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء، فاطلب مزيدا من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني أو الممرض/الممرضة.

4. ما هي الآثار غير المرغوب فيها المحتملة ؟

مثل جميع الأدوية، قد يسبب هذا الدواء آثارا غير مرغوب فيها، ولكنها لا تحدث بشكل منتظم لدى جميع الأشخاص.

قد يسبب هذا الدواء الآثار الغير مرغوب فيها المذكورة أدناه.

ردود الفعل تتطلب انتباها خاصا :

ردود فعل أرجية :

- طفح جلدي
- التهاب الأوعية الدموية الذي قد يظهر في شكل بقع حمراء أو أرجوانية على الجلد، والتي قد تؤثر أيضا على أجزاء أخرى من الجسم،
- حمى والام المفاصل و العقد في الرقبة والإبط والفخذ،
- في بعض الأحيان تورم الوجه أو الحلق (وذمة وعائية)، مما يتسبب في صعوبات في الجهاز التنفسي.
- انزعاج فجئي مصحوب بانخفاض في ضغط الدم.
- الام في الصدر في سياق ردود فعل تحسسية، والتي قد تكون من أعراض احتشاء عضلة القلب الناجم عن الحساسية (متلازمة كونيس).

➢ اذا احسست بأحدى هذه الاعراض، **استشر طبيبك في الحال. توقف عن استعمال فامكس®.**

التهاب الأمعاء الغليظة :

التهاب الأمعاء الغليظة، مما قد يسبب إسهال مائي مصحوب بدم ومخاط ، آلام في المعدة و / أو الحمى.

التهاب البنكرياس الحاد (التهاب البنكرياس الحاد) :

إذا كنت تشعر بألم شديد ومستمر في المعدة، فقد يكون ذلك علامة على التهاب البنكرياس الحاد.

متلازمة التهاب الأمعاء والقولون الناجم عن الأدوية (SEIM) :

تم الإبلاغ عن متلازمة التهاب الأمعاء والقولون الناجم عن الأدوية (SEIM) بشكل رئيسي لدى الأطفال الذين يتلقون أموكسيسيلين/حمض الكلافولانيك، وهي نوع من الحساسية التي تتمثل أعراضها الرئيسية في القيء المتكرر (بعد 1 إلى 4 ساعات من تناول الدواء). قد تشمل الأعراض الأخرى الألما في البطن، وخمولا، وإسهالا، وانخفاضا في ضغط الدم.

➢ إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، **استشر طبيبك في أقرب وقت ممكن.**

آثار غير مرغوب فيها شائعة : (يمكن أن تؤثر على أقل من 1 من كل 10 أشخاص) :

القلاع (مرض سببه الفطريات، الميبضات، التي تتطور في المهبل أو الفم أو طيات الجلد)، الإسهال.

آثار غير مرغوب فيها غير مألوفة : (قد تؤثر على أقل من 1 من كل 100 شخص) :

- طفح جلدي، حكة،
- طفح بارز مع حكة،
- غثيان، خاصة عند تجاوز الجرعة.

➢ إذا تعرضت انت أو طفلك لآثار غير مرغوب فيها، **فاستعمل فامكس® قبل وجبات الطعام.**

- تقيء، عسر هضم، دوخة وصداع

آثار غير مرغوب فيها غير شائعة يمكن اكتشافها عن طريق فحوصات الدم :

زيادة بعض الإنزيمات التي ينتجها الكبد

آثار غير مرغوب فيها نادرة : (يمكن أن تؤثر على أقل من 1 من كل 1000 شخص) :

- طفح جلدي، يمكن أن يشكل بثور تشبه بقع صغيرة (بقع سوداء مركزية محاطة بمنطقة أكثر شحوب، مصحوبة بحلقة داكنة حولها : حمامي عديدة الأشكال).

➢ إذا لاحظت أيا من هذه الأعراض، **اتصل بطبيبك على وجه السرعة.**

- تورم و احمرار على طول الوريد، الذي قد يصبح حساسا للغاية عند اللمس.

الآثار الغير مرغوب فيها النادرة التي يمكن اكتشافها عبر فحوصات الدم :

- انخفاض عدد الصفائح الدموية.
- انخفاض خلايا الدم البيضاء.

الآثار الغير مرغوب فيها ذات التردد الغير معروف :

- ردود فعل أرجية (انظر أعلاه)،
- التهاب الأمعاء الغليظة (انظر أعلاه)،
- التهاب الغشاء الواقي المحيط بالدماغ (التهاب السحايا العقيم)،
- تفاعلات جلدية خطيرة :
- طفح موسع مع تقرحات وتقشير الجلد، خاصة حول الفم والأنف والعينين وفي منطقة الأعضاء التناسلية (متلازمة ستيفنز جونسون)، وشكل أكثر خطورة، مسؤول عن تمزق كبير للجلد أكثر من 30 من مساحة سطح الجسم : متلازمة ليل،
- طفح أحمر كثيف مع بثور صغيرة تحتوي على صديد (التهاب الجلد الفقاعي أو التقشري).
- طفح جلدي حرشفي موسع مع كتل محتوية على بثور تحت الجلد (طفح جلدي باكستائي)
- طفح جلدي مع بثور مرتبة في شكل دائري وقشور في الوسط أو تبدو كعقد من اللؤلؤ (التهاب الجلد الخطي IgA)
- أعراض شبيهة بأعراض الأنفلونزا مصحوبة بطفح جلدي وحمى وتورم الغدد اللمفاوية ونتائج غير طبيعية في فحوصات الدم إنما في ذلك زيادة في عدد خلايا الدم البيضاء (فرط الحمضات) وإنزيمات الكبد] [متلازمة فرط الحساسية للأدوية (DRESS)].

➢ إذا واجهت أيا من هذه الأعراض، اتصل بالطبيب على الفور.

- التهاب الكبد
- التهاب الأغشية المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكي (التهاب السحايا العقيم)؛
- اليرقان الناجم عن زيادة في مستوى البيليروبين في الدم (مادة منتجة في الكبد)، مما يعطي اللون الأصفر للجلد و لبياض العين،
- التهاب الكلى،
- طول وقت تخثر الدم،
- تشنجات (لدى الأشخاص الذين يتناولون جرعات عالية من فامكس® أو يعانون من مشاكل في الكلى).

ردود فعل سلبية يمكن اكتشافها عن طريق فحوصات الدم أو البول :

- انخفاض كبير في عدد خلايا الدم البيضاء،
- انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم الانحلالي)،
- بلورات في البول.

• نظرا لوجود البوتاسيوم، إمكانية التهاب وريدي أو إحساس بألم في موضع الحقن.

الابلاغ عن الآثار الجانبية

إذا شعرت بأي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني. وينطبق هذا أيضا على أي آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة. يمكنك أيضا الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرة من خلال النظام الوطني للإبلاغ : https ://vigifloweforms.who-umc.org/tn/cnpv من خلال الإبلاغ عن الآثار الغير مرغوب فيها، فإنك تساعد في توفير المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

5. كيفية حفظ فامكس®

احفظ هذا الدواء بعيدا عن متناول الأطفال. لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية الموضح على الزجاجة. تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى آخر يوم في هذا الشهر. لا ترمي أي دواء في المجاري. اطلب من الصيدلاني التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. هذه الإجراءات ستساعد في حماية البيئة.

• **قبل الإستعمال :** يحفظ هذا الدواء في درجة حرارية لا تتجاوز 25 درجة مائوية.

• **بعد تحضير المحلول الدوائي :**يجب إستعماله في الحال.

6. محتويات العلبة ومعلومات أخرى

ما يحتويه فامكس® :

▪ **فامكس® 500 مغ/50 مغ للأطفال و الرضع**

المواد الفعالة هي :

أموكسيسيلين (في شكل أموكسيسيلين الصوديوم).....500 مغ

حامض الكلافيلانيك (في شكل كلافيلانات البوتاسيوم).....50 مغ

المكونات الأخرى : لا شيء.

▪ **فامكس® 1 غ/100 مغ للأطفال**

أموكسيسيلين (في شكل أموكسيسيلين الصوديوم)..... 1 غ

حامض الكلافيلانيك (في شكل كلافيلانات البوتاسيوم)..... 100 مغ

المكونات الأخرى : لا شيء.

▪ **فامكس® 1 غ/200 مغ للبالغين**

أموكسيسيلين (في شكل أموكسيسيلين الصوديوم)..... 1 غ

حامض الكلافيلانيك (في شكل كلافيلانات البوتاسيوم)..... 200 مغ

المكونات الأخرى : لا شيء.

▪ **فامكس® 2 غ / 200 مغ للبالغين**

أموكسيسيلين (في شكل أموكسيسيلين الصوديوم)..... 2 غ

حامض الكلافيلانيك (في شكل كلافيلانات البوتاسيوم)..... 200 مغ

المكونات الأخرى : لا شيء.

ما هو فامكس® و محتوى العلبة الخارجية.

- فامكس® 500 مغ/ 50 مغ للأطفال و الرضع، مسحوق لمستحضر للحقن داخل الوريد، علبة تحتوي على قارورة واحدة (التأشيرة : 9093381) و 10 قوارير (التأشيرة : 9093382).
- فامكس® 1 غ / 100 مغ للأطفال، مسحوق لمستحضر للحقن داخل الوريد، علبة تحتوي على قارورة واحدة (التأشيرة : 9093387) و 10 قوارير (التأشيرة : 9093388).
- فامكس® 1 غ / 200 مغ للبالغين، مسحوق لمستحضر للحقن داخل الوريد، علبة تحتوي على قارورة واحدة (التأشيرة : 9093385) و 10 قوارير (التأشيرة : 9093386).
- فامكس® 2 غ / 200 مغ للبالغين، مسحوق لمستحضر للحقن داخل الوريد، علبة تحتوي على 10 قوارير (التأشيرة : 9093389).

جدول أ

صاحب ومشّل ترخيص التسويق والمصنّع :

يونيمد

المنطقة الصناعية القلعة الكبرى

ص.ب : 38 - 4060 تونس

آخر تاريخ تمت فيه مراجعة هذه النشرة : ديسمبر 2025.

توصية صحية :

ماذا يجب أن تعرف عن المضادات الحيوية ؟

المضادات الحيوية فعّالة في مكافحة الالتهابات الناتجة عن البكتيريا، لكنها غير فعّالة ضد الالتهابات الناتجة عن الفيروسات.

قام طبيبك بوصف هذا المضاد الحيوي لك لأنه مناسب تماما لحالتك المرضية الحالية.

يمكن للبكتيريا أن تبقى على قيد الحياة أو تتكاثر على الرغم من تأثير المضاد الحيوي .وتُعرف هذه الظاهرة باسم المقاومة، وهي تؤدي إلى جعل بعض العلاجات بالمضادات الحيوية عديمة الفعالية.

تزداد المقاومة نتيجة الاستعمال المفرط أو غير المناسب للمضادات الحيوية.

قد تساهم في ظهور بكتيريا مقاومة، وبالتالي تأخير الشفاء أو فقدان فعالية هذا الدواء، إذا لم تلتزم بـ :

- ☐ الجرعة المقررة،
- ☐ مواعيد تناول الدواء،
- ☐ مدة العلاج المحددة

للحفاظ على فعالية هذا الدواء، يجب اتباع الإرشادات التالية :

1- لا تستعمل المضاد الحيوي الا إذا وصفه لك الطبيب.

2- التزم تماما بتعليمات وصفة الطبيب.

3- لا تستعمل المضاد الحيوي مرة أخرى من تلقاء نفسك حتى وإن ظهرت عليك أعراض مشابهة.

4- لا تعط المضاد الحيوي لأي شخص آخر، فقد لا يكون مناسبا لحالته المرضية.

5- بعد انتهاء العلاج، أعد ما تبقى من العلبة المفتوحة إلى الصيدلاني للتخلص منها بشكل سليم وآمن.

إن هذا دواء
- ○ الدواء هو منتج و لكن ليس مثل الآخرين،
- ○ الدواء هو منتج يؤثر على صحتك، واستهلاكه بشكل لا يتوافق مع الوصفات الطبية يعرضك للخطر،
- ○ احترم بدقة وصفة طبيبك و تعليمات الطريقة التي وصفها لك،
- ○ الطبيب و الصيدلاني عليمان بالدواء وموانع استعماله،
- ○ لا توقف و لا تزيد الجرعات دون استشارة طبيبك،
- ○ لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

14VAM101

Titre :	**Notice VAAMOX**
Version :	**07**
Couleur	**Noir - P Reflex blue C équivalent RVB : 0 – 76 -153**
Date de réalisation :	01/12/2025
Dimension	**345 x 190 mm**
Destination (Pays.) :	**TUNISIE**