

HYALUVISC® FREE

Sodium hyaluronate 18mg/10ml

Eye lubricant, bottle of 10 ml

FORM AND PRESENTATION:

Sterile solution for topical ophthalmic use.

Box of 1 bottle of 10 ml.

COMPOSITION:

Sodium hyaluronate180 mg

Sodium chloride, potassium chloride, magnesium chloride, calcium chloride, disodium hydrogenophosphate, sodium citrate, hydrochloric acid, WFI100 ml

PROPERTIES AND MECHANISM OF ACTION:

- Sterile ocular lubricant.
- HYALUVISC® FREE contains sodium hyaluronate, a natural polymer also present in the structures of the human eye. The particular physical characteristics of sodium hyaluronate give to HYALUVISC® FREE its viscoelastic and water retention properties.
- HYALUVISC® FREE therefore forms a stable film on the surface of the eye that is only very slowly eliminated by the blinking of the eyelids.
- HYALUVISC® FREE combines therefore a prolonged effect with a maximum of comfort. Because of its special composition, HYALUVISC® FREE is very well tolerated.

INDICATIONS:

Moderate to severe sensations of dry eyes.

CONTRAINDICATIONS:

HYALUVISC® FREE is contraindicated in case of allergy to one of the components.

WARNINGS AND PRECAUTIONS FOR USE:

- Do not inject, do not swallow.
- Remove contact lenses before application and wait at least 15 minutes before putting them back on
- Avoid touching the eye or eyelids with the tip of the bottle.

IF PROBLEMS PERSIST DURING THE USE OF HYALUVISC® FREE, CONSULT A DOCTOR. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

INTERACTIONS:

If you are taking medicine to be administered into the eye, you must first administer the other medicine, then wait 15 minutes and finally apply HYALUVISC® FREE last.

IN ORDER TO AVOID POSSIBLE INTERACTIONS BETWEEN SEVERAL MEDICINES, YOU SHOULD SYSTEMATICALLY INFORM YOUR DOCTOR OR PHARMACIST OF ANY OTHER CURRENT TREATMENT.

PREGNANCY AND BREASTFEEDING:

HYALUVISC® FREE should be used with caution during pregnancy. It is improbable that components of the product pass into the milk during breast-feeding.

IN ALL CASES, ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST FOR ADVICE.

DRIVING AND USING MACHINES:

For a short time after application and until HYALUVISC® FREE is evenly distributed on the eye, vision may be blurred. This should be taken into account when using machines as well as in road traffic.

SIDE EFFECTS:

In very rare cases: transient disorders such as conjunctival irritation, foreign body sensation, redness or burning of the eye and momentary blurred vision may occur.

TELL YOUR DOCTOR OR PHARMACIST OF ANY UNWANTED OR UNCOMFORTABLE EFFECTS NOT MENTIONED IN THIS LEAFLET.

POSODOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION:

Posology:

- 1 to 2 drops in the conjunctival sac of the affected eye as often as necessary or per the medical prescription.
- A few blinks of the eyelids will ensure an even distribution of the solution on the ocular surface in a transparent and durable film.

Method of administration:

- Ophthalmic route.
- Wash your hands carefully.
- Do not touch the eye with the tip of the bottle.
- Instill the drop of HYALUVISC® FREE into the conjunctival cul-de-sac, pulling the lower eyelid slightly downwards and looking upwards.
- Blink several times to allow the drop to spread over the eye.
- After use and before recapping, the bottle should be shaken once downwards, without touching the tip of the dropper, to remove any liquid remaining on the tip. This is necessary to ensure delivery of the next drops.
- Recap the bottle after use.


STORAGE CONDITIONS:

- Store at a temperature between 2 °C and 25 °C.
- Any opened bottle must be used within 90 days.

Medical device, class IIb.

STERILE

Sterilized according to an aseptic processing technique



Storage temperature



Please refer to the explanatory leaflet

LOT


Batch/lot number




Manufacture date




Expiry date



Wash your hands thoroughly



Unscrew the cap



Turn the bottle upside down, press slightly in the middle and instill into the lower conjunctival cul-de-sac of the eye, looking upwards and pulling the lower eyelid slightly downwards.



After use and before recapping, the bottle should be shaken once downwards, without touching the tip of the dropper, to remove any liquid remaining on the tip.



Distributed by: UNIMED INTERNATIONAL TRADING

P.O. Box 24737 - Doha, Qatar

Phone: (+ 974) 44727396 - E-mail: info@unimedfactory.com

Web site: www.unimedfactory.com

Manufactured by: UNIMED

LZ Kalaa Kebira P.O.Box: 38 - 4060 TUNISIA

Phone: (+ 216) 70 029 501 - Fax: (+216) 73 342 472

Web site: www.unimed.com.tn

Edition : 02

Date : 10 / 2023

14HVC681

Titre :	Notice HYALUVISC FREE® 10 ml
Version :	02
Date de réalisation :	18/10/2023
Dimension :	120 x 240 mm
Destination (Pays....) :	QATAR

هياالوفيسك® فري

هياالورونات الصوديوم 18 مغ/مل
مرزق للعين، قارورة ذات 10 مل

الشكل :

محلول معقم للإستعمال الموضعي للعين.
علبة تحتوي على قارورة ذات 10 مل.

التركيبية :

هياالورونات الصوديوم.....180 مغ
كلوريد الصوديوم، كلوريد البوتاسيوم، كلوريد المغنيزيوم، كلوريد
الكالسيوم، هيدروجين فسفات ثنائي الصوديوم، سترات الصوديوم،
حمض الهيدروكلوريك، ماء صالح للحقن كلف لـ.....100 مل
الخصائص و كيفية الفاعلية :

- مرزق معقم للعين.
- هياالوفيسك® فري يحتوي على هياالورونات الصوديوم، وهو بلور
طبيعي موجود في مكونات عين الإنسان. تمنح المميزات
الفيزيائية الخاصة بهياالورونات الصوديوم لهياالوفيسك® فري
خصائصه اللزجة و قدرته على إحتباس الماء.
- يكون هياالوفيسك® فري غشاء مستقرا على مساحة العين، لا يزال
بسرعة عند رمش الجفون.
- يجمع هياالوفيسك® فري بين التأثير المطول مع درجة قصوى من
الراحة. التركيبة الخاصة بهياالوفيسك® فري تجعله جيد التحمل.

دواعي الإستعمال :

إحساس معتدل أو شديد بجفاف العين.

موانع الإستعمال :

يجب عدم إستعمال هياالوفيسك® فري في حالة الأرجية ضد أحد
مكوناته.

التحذيرات و إحتياطات الإستعمال :

• لا يحقن لا يبلع.
- قم بنزع العدسات اللاصقة قبل الإستعمال وانتظر على الأقل مرور
15 دقيقة قبل إرجاعها.
- يجب تفادي لمس العين أو الجفون بطرف القطارة.
- إستشر طبيبك في حالة إستمرار الإضطرابات خلال إستعمال
هياالوفيسك® فري.

لا يترك هياالوفيسك® فري في متناول الأطفال.

التفاعلات :
إن كنت تستعمل أدوية أخرى عبر العين، عليك تطهيرها أولا ثم
انتظر 15 دقيقة بين القطرتين و قم بتطهير هياالوفيسك® فري في
آخر الأمر.
لتفادي التفاعلات بين الأدوية، يجب إعلام الطبيب أو الصيدلاني
في حالة إستعمال أدوية علاجية أخرى.

الحمل و الإرضاع
- يجب إستعمال هياالوفيسك® فري بحذر خلال فترة الحمل.
- من غير المحتمل أن تمر مكونات هياالوفيسك® فري داخل حليب
الأم خلال فترة الرضاعة.

في كل الحالات إستشيري الطبيب أو الصيدلاني.

السياقة و إستعمال الآلات :

قد يحدث تخيم الرؤية لمدة وجيزة بعد الإستعمال و إلى حد توزيع
منتظم لهياالوفيسك® فري في العين. لذلك يجدر أخذ ذلك بعين
الإعتبار عند إستعمال الآلات و عند القيادة.

تأثيرات غير مرغوب فيها :

في حالات جد نادرة : إضطرابات عابرة مثل تهيج الملتحمة،
الإحساس بوجود جسم غريب، إحمرار أو إحساس بحرقاة في
العين مع إمكانية حدوث تخيم في الرؤية لحظي.
أعلم الطبيب أو الصيدلاني في حالة ظهور تأثيرات غير مرغوب
فيها أخرى غير مذكورة في هذه النشرة.

المقادير و طريقة الإستعمال :

- قطرة أو قطرتان في كيس الملتحمة في العين المصابة، كلما
استدعت الحالة إلى ذلك أو حسب الوصفة الطبية.
- إن رمش الجفون يمكن أن يتكثف بالتوزيع المتساوي للمحلول
على سطح العين و ذلك في شكل غشاء شفاف و دائم.

طريقة الإستعمال :

• للتقطير داخل العين.
- غسل اليدين جيدا.
- تفادي تماس طرف القطارة مع العين.
- تطهير قطرة من هياالوفيسك® فري داخل ردة الملتحمة السفلى
للعين و ذلك بالنظر إلى أعلى و جذب الجفن السفلي قليلا إلى
الأسفل.
- ارمش عينك عدة مرّات لتنتشر القطرة على العين.
- بعد الإستعمال وقبل إعادة التعبئة، يجب أن تهز القارورة مرّة
واحدة في اتجاه الأسفل، دون لمس طرف القطارة، لإزالة أي
سائل متبقي على الحافة و ذلك لضمان توزيع القطرات اللاحقة.
- يجب إحكام غلق القارورة بعد كل عملية إستعمال.

الحفظ :

- يحفظ في درجة حرارية بين 2 و 25 درجة مائوية.
- يجب استعمال كل قارورة مفتوحة خلال 90 يوما.
جهاز طبي، صنف II ب



تاريخ إنتهاء
الصلوحية



تاريخ الصنع



رقم الدفعة



اقرأ النشرة




درجة الحفظ
25°C




معقم باستعمال تقنية
المعالجة المعقمة




بعد الإستعمال وقبل إعادة التعبئة،
يجب أن تهز القارورة مرّة واحدة في
اتجاه الأسفل، دون لمس طرف
القطارة، لإزالة أي سائل متبقي
على الحافة.



إقلب القارورة واضغط على وسطها
بلين، لتنتزل القطرة في العين، قَطُر
داخل ردة الملتحمة السفلى للعين
و ذلك بالنظر إلى أعلى و جذب
الجفن السفلي قليلا إلى الأسفل.



إبزغ الغطاء



إغسل يديك جيّدا



بورج من طرف : يونيمد إنترناشونال للتجارة
صندوق بريد - 24737 الدوحة قطر
الهاتف : 44727396 (+974)
البريد الإلكتروني : info@unimedfactory.com
موقع الويب : www.unimedfactory.com
صنع من طرف : يونيماد
المنطقة الصناعية الطقة الكبرى ص.ب. 38 - 4060 تونس
الهاتف : 70 029 501 (+216) - الفاكس : 73 342 472 (+216)
موقع الويب : www.unimed.com.tn

نشرة : 02
تاريخ : 10 / 2023
14HVC681

Titre :	Notice HYALUVISC FREE® 10 ml
Version :	02
Date de réalisation :	18/10/2023
Dimension :	120 x 240 mm
Destination (Pays....) :	QATAR